



# PRODUCT LIST | HISTORY

- 1984 | 대한신약주식회사 설립  
| 동물용 사료첨가제 사업 개시
- 1994 | 제약 사업으로의 비즈니스 확장
- 2001 | 대한뉴팜으로 사명 변경
- 2002 | IPO  
| 수출 유망 중소기업 대상 수상
- 2007 | '오백만불 수출의 탑' 수상
- 2012 | 바이오 사업 개시
- 2015 | '천만불 수출의 탑' 수상  
| 바이오 연구소 오픈
- 2016 | 조사료 사업 개시
- 2021 | 대한뉴팜 산학연센터 준공  
| 새로운 CI 공개  
| 건강기능식품 브랜드 '디뉴' 런칭
- 2022 | 반려동물 브랜드 '디아쥬' 런칭
- 2023 | 향남 연구동 준공

## COLORS

### ATC code | 1단계

1단계는 약이 적용되는 해부학적 부위에 따른 대분류.  
A~V 까지 총 14개의 단계가 있습니다.

A	B	C	D	G	H	J
소화/대사	혈액/조혈	심혈관	피부	비뇨/성	전신성호르몬	항감염
L	M	N	P	R	S	V
항종양	근골격	신경	구충/살충	호흡	감각	기타






# PRODUCT LIST | CONTENTS

## 01 | 제품 정보 요약 04













## 02 | 급여 10

-  순환기계 10
-  내분비계 16
-  소화기계 18
-  비뇨기계 23
-  부신흔호르몬제 24
-  항바이러스제 24
-  항생제 25
-  항진균제 28
-  근골격계 29
-  해열진통소염제 30
-  신경계용제 31
-  항히스타민제 32
-  호흡기계 33




## 03 | 비급여 34

-  식욕억제제 34
-  지방흡수억제제 34
-  대사촉진제 35
-  탄수화물흡수억제제 35
-  기타비만보조제 36
-  비타민제 38
-  피부·모발용제 39
-  신경계용제 39

## 04 | 주사제 40


-  비타민제 40
-  무기질제제 42
-  항산화제 43
-  순환기계용제 43
-  진경제 44
-  단백아미노산제제 44
-  항악성종양제 45
-  통증치료제 46
-  근골격계용제 47
-  백신·항독소 48
-  기타약물 49
-  NEW 50

## 05 | 의료기기 및 기타 51

-  의료기기 51
-  마취제 51
-  건강기능식품 52

## ATC code | 2단계

2단계는 약효에 따른 세부 분류이며,  
1~16까지 숫자로 표기됩니다.



# 급여 PRODUCT LIST | SUMMARY

계열분류	세부계열	제품명	성분명	대조약
<b>B C</b> 01 01 01 08 09 10  <b>순환기계</b>	CCB+ARB+Statin	<b>아바트리정</b> <small>개량신약</small>	Amlodipine /Valsartan / Atorvastatin	-
	CCB+ARB+HCTZ	<b>뉴비카플러스정</b>	Amlodipine / Olmesartan / Hydrochlorothizide	세비카에이치씨티정
	CCB	<b>암로크정</b>	amlodipine	노바스크정
	ARB	<b>테르탄정</b>	Telmisartan	미카르디스정, 프리토정
		<b>뉴메살탄정</b>	Olmesartan	올메텍정
	ARB+HCTZ	<b>대한뉴팜로잘탄플러스정</b>	Losartan / Hydrochlorothiazide	코자플러스정
	ARB+CCB	<b>엔피포지정</b>	Valsartan / Amlodipine	엑스포지정
		<b>엔피스타정</b>	Telmisartan / Amlodipine	트윈스타정
		<b>뉴비카정</b>	Olmesartan / Amlodipine	세비카정
	Statin	<b>뉴토르정</b>	Atorvastatin	리피토정
		<b>뉴스토정</b>	Rosuvastatin	크레스토정
		<b>뉴바로정</b>	Pitavastatin	리바로정
	Statin+Ezetimibe	<b>뉴토젯정</b>	Atorvastatin / Ezetimibe	아토젯정
		<b>엔피토린정</b>	Simvastatin / Ezetimibe	바이토린정
	Statin+Omega-3	<b>뉴토메가연질캡슐</b>	Atorvastatin / Omega-3	-
	ADP Ri	<b>뉴피도정</b>	Clopidogrel	플라빅스정
	5-HT <sub>2</sub> Ri	<b>뉴포그릴SR정</b>	Sarpogrelate	안플라그정
	PDE inhibitor	<b>실로탈서방캡슐</b>	Cilostazol	프레탈서방캡슐
혈소판 cAMP 증진제	<b>리마글란정</b>	Limaprost	동아오팔몬정	
관상동맥 치료제	<b>메타진정</b>	Trimetazidine	바스티난정	
<b>A</b> 10 16  <b>내분비계</b>	SGLT-2 inhibitor	<b>엔피다파정</b>	Dapagliflozin	포시가정
		<b>다파포민서방정</b>	Dapagliflozin / Metformin	직듀오서방정
	DDP-IV inhibitor	<b>뉴라젠타정</b> <small>3월출시</small>	Linagliptin	트라젠타정
		<b>시타틴알파정</b>	Sitagliptin	자누비아정
		<b>시타포민알파정</b>	Sitagliptin / Metformin	자누메트정
		<b>시타포민엑스알서방정</b>	Sitagliptin / Metformin	자누메트엑스알서방정
		<b>테넬틴정</b>	Teneligliptin	테넬리아정
		<b>테넬포민서방정</b>	Teneligliptin / Metformin	테넬리아엠서방정
	SGLT-2 inhibitor + DPP-IV inhibitor	<b>듀오글리정</b>	Dapagliflozin / Sitagliptin	-
	Sulphonylurea	<b>그리자이드정</b>	Gliclazide	디아미크롱정
	Sulphonylurea + Biguanide	<b>게리메트정</b>	Glimepiride / Metformin	아마릴엠정
	α-Lipoic Acid	<b>알포익정</b>	R-thioctic acid	덱시드정



# 급여 PRODUCT LIST | SUMMARY

계열분류	세부계열	제품명	성분명	대조약
A 02 03 07  소화기계	PPI	라피듀오정 <small>국내유일</small>	Rabeprazole / Magnesium Oxide	-
		라피졸정	Rabeprazole	파리에트정
		대한뉴팜오엠프라졸캡슐	Omeprazole	유한로섹캡슐
		에스오엠정	Esomeprazole	넥시움정
	H <sub>2</sub> -Blocker	파밀란정	Famotidine	동아가스터정
		뉴잔틴캡슐	Nizatidine	엑시드캡슐
		뉴토가정	Lafutidine	스토가정
	위 점막 보호제	무코란정	Rebamipide	무코스타정
		엔피렌정	Artemisia asiatica 95% ethanol ext.	스티렌정
		엔피렌에스정	Artemisia asiatica 95% ethanol ext.	스테렌투엑스정
	진경제	티파론정	Tiropamide	티로파정
	위 운동 개선제	레보란정	Levosulpiride	레보프라이드정
	정장제	모사가틴정	Mosapride	가스모틴정
		아시토바캡슐 <small>상반기출시</small>	Lactobacillus acidophilus	안티비오캡슐
G 04  비뇨기계	Antimuscarinic	뉴페신정	Solifenacin	베시케어정
	BPH α-Blocker	타로신서방정	Tamsulosin	-
		테트린정	Terazosin	일양하이트린정
	BPH 5α 환원효소저해제	엔피스카정	Finasteride	프로스카정
		엔피다트정	Dutasteride	-
H   02 부신흔호르몬제	Corticosteroid 호르몬제	히티손정	Hydrocortisone	하이손정
J   05 항바이러스제	Herpes 치료제	팜디악정	Famciclovir	팜비어정
J 01  항생제	Penicillin 계	아목탐정	Amoxicillin / sulbactam pivoxyl	셀타목스정
		아목클정	Amoxicillin / clavulanate potassium	오구멘틴정
		아목클시럽	Amoxicillin / clavulanate potassium	-
	Cephalosporin 계 1세대	사프딘캡슐	Cephadrine	유한세프라딘캡슐
		세플러캡슐	Cefaclor	시클러캡슐
	Cephalosporin 계 2세대	록시티로신정	Roxithromycin	루리드정
		클래마신정	Clarithromycin	클래리스드필름코팅정
	Macrolide 계	클래마신건조시럽	Clarithromycin	-
		에프로신정	Ciprofloxacin	씨프로바이정
	Quinolone 계	레비신정	Levofloxacin	제일크라비트정

# 급여 PRODUCT LIST | SUMMARY

계열분류	세부계열	제품명	성분명	대조약
J   02 항진균제	전신성 항진균제	푸졸캡슐	Fluconazole	디푸루칸캡슐
		이코졸정	Itraconazole	-
M 03 05 근골격계	근이완제	에피손정	Eperisone	뮤렉스정
	골다공증 치료제	에피손SR서방정	Eperisone	네렉손서방정
		알로본플러스디정	Alendronate / Cholecalciferol	포사맥스플러스디정
세로본플러스정	Risedronate / Cholecalciferol	리세넥스플러스정		
M N 01 02 해열진통소염제	NSAIDs	아세파인정	Acedofenac	에어탈정
		메록감캡슐	Meloxicam	모빅캡슐
		록스파인정	Loxoprofen	록소닌정
		덱시파인정	Dexibuprofen	닥스펜정, 썬라틸정, 애니펜정
		셀렉코캡슐	Celecoxib	세레브렉스캡슐
		모루밍정	Morniflumate	모니플루정
	비마약성 진통제	무파인서방정	Acetaminophen / Tramadol	울트라셋이알서방정
무파인세미정	Acetaminophen / Tramadol	울트라셋세미정		
무파인세미서방정	Acetaminophen / Tramadol	울트라셋이알세미서방정		
N   02, 06 신경계용제	항전간제	가바텐캡슐	Gabapentin	뉴론틴캡슐
	알츠하이머 치료제	엔피셉트정	Donepezil	아리셉트정
R   06 항히스타민제	2세대	베포타틴정	Bepotastine	타리온정
	3세대	아젤라스정	Azelastine	부광아젠티정
		레보티진정	Levocetirizine	씨잘정
R 01 03 05 07 호흡기계	거담제	헤데란시럽	Hedera Fluid Ext.	-
		뮤시딘캡슐	Acetylcysteine	뮤테란캡슐
		에스텐캡슐	Erdosteine	엘도스캡슐
	기침 & 감기 치료제	엘피진정	Levodropropizine	드로피진정
		뉴카민시럽	Pelargonium sidoides	움카민시럽
	비강질환 치료제	모메탈나잘스프레이	Mometasone Furoate	-
Leukotriene 조절제	몬테스트정	Montelukast	싱글레어정	

# 비급여 PRODUCT LIST | SUMMARY

계열분류	제품명	성분명	대조약
A   08 식욕억제제	피티엠정	Phentermine HCl	아다펙스정
	페스틴정	Phentermine HCl	푸리민정
	펜틴정	Phendimetrazine tatarate	푸링정
A   08 지방흡수억제제	제로비캡슐	Orlistat	제니칼캡슐
	제로비정	Orlistat	제니칼캡슐
A   08 16 R   05 대사촉진제	디카틴정	L-Carnitine	엘칸정
	다이엔캡슐	Green tea powder / Orthosiphon powder	-
	카푸린에스정	Ephedrine HCl / Acetaminophen / Caffeine anhydrous	-
A   10 V   03 탄수화물 흡수억제제	미그보스필름코팅정	Miglitol	-
	루치온정	Glutathione(reduced)	비스타치정 / 글루100정
	카보글루엑스캡슐	흰강낭콩분말 / Vit.C / Vit. B / Vit.B2 / Vit.B6 /Whey Calcium	건강기능식품
	버닝슬림정 <b>NEW</b>	가르시니아캄보지아추출분말, 스누원더하바네로분말	건강기능식품
A C N R 03 10 03 06 06 06 08 07 기타비만보조제	탐부틴정	Trimebutine maleate	포리부틴정
	마노엘정	Aloe Ext. / Magnesium hydroxide / Ursodeoxycholic acid	-
	뉴코딜정	Bisacodyl / Docusate sodium	-
	마메이드정	Alginate acid / Carboxymethyl cellulose sodium	-
	캠벨정	방풍통성산건조엑스 (4.64 → 1)	-
	캠벨더블정 <b>NEW</b>	방풍통성산건조엑스 (4.64 → 1)	-
	나오미정	방기황기탕건조엑스 (7.52 → 1)	-
	콜레스텐연질캡슐	Safflower oil / Tocopherol acetate / Pyridoxine HCl 0.67mg	-
	토피정	Topiramate	토파맥스정
	토피트정	Topiramate	토파맥스정
	디프렌캡슐	Fluoxetine HCl	폭세틴캡슐/푸로작캡슐
	나렉스정	Naltrexone HCl	-
	히스탐에프정	Betahistine HCl	메가베타정
파인에스정	Bromelain / Caffeine anhydrous / Diphenhydramine HCl	-	
A   11 비타민제	엔피비타비정 <b>상반기출시</b>	Benfotiamine 외	-
	엔피셀렌씨정 <b>상반기출시</b>	Selenium in dried yeast 외	-
	바이타비정	Folic acid / Cyanocobalamin Pyridoxine HCl 50mg	-
	에니플러스캡슐	Vit. C / Magnesium oxide / Crystalline cellulose / L-tyrosine	건강기능식품
D   11 피부·모발용제	엔피나정	Finasteride	프로페시아정
N   06 신경계용제	지타코정 <b>NEW</b>	Ginkgo leaf dry extract	-

# 주사제 PRODUCT LIST | SUMMARY

계열분류	제품명	성분명
<b>A B</b> 11 03 05 <b>비타민제</b>	멀티비타주	Vit.C, Biotin,Cyanocobalamin, Dexpanthenol, Ergocalciferol, Folic acid, Nicotinamide, Pyridoxine, Riboflavin phosphate, Thiamine, Tocopherol acetate, Vit.A
	대한뉴팜비타민사주 20mL	Ascorbic acid
	푸르민주 5mg	Fursultiamine HCl
	펜타비타주	Dexpanthenol
	헥사비타주	Pyridoxine HCl
	비코라민주	Hydroxocobalamin
	바이타디주	Cholecalciferol
<b>B   05</b> <b>무기질제제</b>	대한뉴팜염화마그네슘주10%	Magnesium chloride
	징크에스주 5mL/10mL	Zinc sulfate hydrate
	셀레네주 10mL	Sodium selenite pentahydrate
	멀티트레이스주	Zinc sulfate, Cupric sulfate, Manganese sulfate, Chromic chloride, Selenious acid
<b>A   16</b> <b>V   03</b> <b>항산화제</b>	신델라주	Thioctic acid
	루치온주 600mg / 1200mg	Glutathione(reduced)
	바이온주	Glutathione(reduced)
<b>A   16</b> <b>N   06</b> <b>순환기계용제</b>	메조카틴주	L-carnitine
	지타코주	Ginkgo leaf extract
<b>A   12</b> <b>진경제</b>	미네엠주	Magnesium sulfate
<b>G   02</b> <b>단백아미노산제제</b>	프라세인엠주	Human Placenta extract
<b>L   01 03</b> <b>항악성종양제</b>	티모신주	Thymosin α1(alpha1)
	이스카도 M / Qu	Viscum Album(Mali/Quercus) Soluble Extract(1→5)
<b>B   06</b> <b>D   03</b> <b>N   02</b> <b>통증치료제</b>	리포라제주	Hyaluronidase
	뉴디엔주	Polydeoxyribonucleotide sodium
	뉴피엔	Sodium Polynucleotide
	콜라폴레오	Attelo collagen
	뉴포팜주	Nefopam HCl
<b>M   05 09</b> <b>근골격계용제</b>	엔피본주	Ibandronate sodium monohydrate
	히아름플러스주	Sodium hyaluronate
	펜믹스졸레드론산주	Zoledronic acid
<b>J   06 07</b> <b>백신 · 항독소</b>	바리-엘백신	약독수두생바이러스
	보란건조살무사항독소주	건조살무사항독소

# 주사제 PRODUCT LIST | SUMMARY

계열분류	제품명	성분명
A   05 16 N   06 V   03 <b>기타약물</b>	리코리스주 10mL/20mL	Ammonium Glycyrrhizinate, Glycine, Cysteine Hydrochloride Monohydrate
	이엔지주	Adenosine triphosphate disodium trihydrate
	사메주	S-adenosyl- L-methionine
	뉴제닐주 2mL/5mL	Flumazenil
	디뉴덱스주	Sugammadex
<b>NEW</b>	더마신델라	Polynucleotide sodium
	엔피플루프리믹스주	Peramivir hydrate
	중외주사용수	Water for injection
	대한뉴팜아르기닌프리믹스주	L-arginine hydrochloride

# 의료기기 및 기타 PRODUCT LIST | SUMMARY

계열분류	제품명	성분명
<b>의료기기</b>	큐젤 Ultra / Strong	Hyaluronic acid
	플로레리도카인 S / N	Hyaluronic acid
<b>마취제</b>	리도칸크림	Lidocaine
<b>건강기능식품</b>	아스코르빈산	Ascorbic acid
	MSM	MSM(Methyl sulfonylmethane)
	Dr.DiNU 엠에스엠 정 <b>NEW</b>	MSM(Methyl sulfonylmethane)
	Dr.DiNU 슈퍼아르기닌플러스포	L-Arginine, 비타민B1, B2, B6, 나이아신, 판토텐산, 9종 아미노산, 인진쑥추출발효분말
	Dr.DiNU 글루타민포	L-Glutamine, L-Arginine, 아연, 비타민A, 락토페린농축물, 유단백 가수분해물
	Dr.DiNU 이문알파캡슐	아연, 면양홍선분말, MSM, 연어이리단백추출물분말
	모노메가3	EPA, DHA, DPA, Vit.E
	얼티메이트 큐텐	코엔자임Q10, PQQ, BioPerine, Organic Olive Oil
	호모시스트를 비-콤플렉스	비타민B1, B2, 나이아신, 판토텐산, 비타민B6, 비오틴, 엽산(활성형), 비타민B12, 콜린, 이노시톨, BioPerine
	울트라 코랄 칼마징크 D	칼슘(Coral), 마그네슘, 아연, 비타민D, Wolf Berry Extract, Shark Cartilage
뉴트럴 화이트-씨	비타민C(calcium), Naringin Extract, Hesperidin, Rutin, Rosa Canina Fruit Extract	

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>아바트리정</b> 5/80/10mg Amlodipine besylate 6.94mg (as Amlodipine 5mg) / Valsartan 80mg / Atorvastatin Calcium Hydrate 10.85mg (as Atorvastatin 10mg)	암로디핀 / 발사르탄 복합제와 아토르바스타틴을 동시에 투여하여야 하는 환자에만 사용		669908020 1,468원		
	<b>아바트리정</b> 5/80/20mg Amlodipine besylate 6.94mg (as Amlodipine 5mg) / Valsartan 80mg / Atorvastatin Calcium Hydrate 21.7mg (as Atorvastatin 20mg)	* 암로디핀 / 발사르탄 복합제 암로디핀 또는 발사르탄 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압	1일 1회 1정 매일 같은 시간 복용 권장	669908030 1,470원	30정/병	<b>C10BX</b> 전문 219 기타의 순환계용약
	<b>아바트리정</b> 5/160/10mg Amlodipine besylate 6.94mg (as Amlodipine 5mg) / Valsartan 160mg / Atorvastatin Calcium Hydrate 10.85mg (as Atorvastatin 10mg)	* 아토르바스타틴 1. 다음의 심장혈관 질환에 대한 위험성감소 2. 이상지질혈증		669908040 1,651원		
	<b>아바트리정</b> 5/160/20mg Amlodipine besylate 6.94mg (as Amlodipine 5mg) / Valsartan 160mg / Atorvastatin Calcium Hydrate 21.7mg (as Atorvastatin 20mg)	* 자세한 내용은 설명서 참조		669908050 1,653원		
	<b>암로크정</b> Amlodipine besylate 6.944mg (as Amlodipine 5mg)	1. 고혈압, 관상동맥의 고정폐쇄(안정형협심증) 또는 관상혈관계의 혈관경련과 혈관수축(이형협심증)에 의한 심근성허혈증 2. 최근 혈관조영술로 관상동맥심질환이 확인된 환자로 심부전이 없거나 심박출량이 40% 미만인 아닌 환자의 -협심증으로 인한 입원의 위험성 감소 -관상동맥 혈관재생술에 대한 위험성 감소	1일 1회 5mg을 경구투여 1일 최고 10mg까지 증량 연령, 증상에 따라 적절히 증감	669906560 312원	30정/병 300정/병	<b>C08CA01</b> 전문 214 혈압강하제
	<b>대한뉴팜 로잘탄플러스정</b> Losartan potassium 50mg / Hydrochlorothiazide 12.5mg	단일요법으로 혈압이 적절히 조절되지 않는 고혈압	1일 1회 1정 식사와 관계없이 투여	669900550 282원	30정/병 300정/병	<b>C09DA01</b> 전문 214 혈압강하제

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>엔피포지정</b> 5/80mg Amlodipine 5mg / Valsartan 80mg	암로디핀 또는 발사르탄 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압	1일 1회 1정 식사와 관계없이 복용	669905910 805원	30정/병	C09DB01 전문 214 혈압강하제
	<b>엔피포지정</b> 5/160mg Amlodipine 5mg / Valsartan 160mg			669905920 988원		
	<b>엔피포지정</b> 10/160mg Amlodipine 10mg / Valsartan 160mg			669905930 1,128원		
	<b>테르탄정</b> 40mg Telmisartan 40mg	1. 본태고혈압 2. 심혈관 질환의 위험성 감소	1. 본태고혈압 1일 1회 40mg 경구투여 필요한 경우 1일 1회 80mg 까지 증량 가능 2. 심혈관 질환의 위험성 감소 1일 1회 80mg 경구투여	669906790 362원	30정 (10정 /PTP×3)	C09CA07 전문 214 혈압강하제
	<b>테르탄정</b> 80mg Telmisartan 80mg			669906800 487원		
	<b>엔피스타정</b> 40/5mg Telmisartan 40mg / Amlodipine 5mg	텔미사르탄 또는 암로디핀 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압	1일 1회 1정 식사와 관계없이 복용	669906990 600원	30정 (10정 /PTP×3)	C09DB04 전문 214 혈압강하제
	<b>엔피스타정</b> 40/10mg Telmisartan 40mg / Amlodipine 10mg			669906970 648원		
	<b>엔피스타정</b> 80/5mg Telmisartan 80mg / Amlodipine 5mg			669906980 725원		
	<b>뉴메살탄정</b> 10mg Olmesartan medoxomil 10mg	본태성 고혈압의 치료	권장 최대용량은 1일 1회 10mg 식사여부와 관계없이 투여 혈압이 적절히 조절되지 않는 경우 1일 1회 20mg으로 증량. 추가적인 혈압 감소효과가 요구되는 경우 1일 최대 40mg까지 증량	669906520 235원	30정/병	C09CA08 전문 214 혈압강하제
	<b>뉴메살탄정</b> 20mg Olmesartan medoxomil 20mg			669906510 354원		

\* 각 제품의 효능 효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.  
\* 약가(상한금액)은 2025년 1월 2일 기준이며 향후 변동될 수 있습니다.



제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>뉴비카정</b> 5/20mg Amlodipine besylate 6.944mg (5mg as amlodipine) / Olmesartan 20mg	암로디핀 또는 올메사르탄메독소밀 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압의 치료	1일 1회 1정	669906670 592원	30정 (10정 /PTP×3)	C09DB02 전문 214 혈압강하제
	<b>뉴비카정</b> 5/40mg Amlodipine besylate 6.944mg (5mg as amlodipine) / Olmesartan 40mg			669906690 644원		
	<b>뉴비카정</b> 10/40mg Amlodipine besylate 13.888mg (10mg as amlodipine) / Olmesartan 40mg			669906680 692원		
	<b>뉴비카플러스정</b> 5/20/12.5mg Amlodipine besylate 6.944mg (5mg as amlodipine) / Olmesartan medoxomil 20mg / Hydrochlorothi- azide 12.5mg	암로디핀과 올메사르탄메독소밀의 복합요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압	1일 1회 1정	669907320 598원	28정 (14정 /PTP×2)	C09DX03 전문 214 혈압강하제
	<b>뉴비카플러스정</b> 5/40/12.5mg Amlodipine besylate 6.944mg (5mg as amlodipine) / Olmesartan medoxomil 40mg / Hydrochlorothi- azide 12.5mg			669907340 650원		
	<b>뉴비카플러스정</b> 10/40/12.5mg Amlodipine besylate 13.888mg (10mg as amlodipine) / Olmesartan medoxomil 40mg / Hydrochlorothi- azide 12.5mg			669907330 698원		

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>뉴토르정 10mg</b> Atorvastatin calcium 10.85mg (as Atorvastatin 10mg)	1. 다음의 심장혈관 질환에 대한 위험성감소 1) 관상동맥 심장 질환에 대한 임상적 증거는 없으나, 관상동맥 심장 질환의 다중위험요소가 있는 성인 환자의 (1) 심근경색증에 대한 위험성 감소 (2) 뇌졸중에 대한 위험성 감소 (3) 혈관재생술 및 만성 안정형 협심증에 대한 위험성 감소 2. 고지혈증 등  * 자세한 내용은 설명서 참조	1일 1회 10mg~80mg의 용량범위로 투여 하루 중 아무 때나 음식물과 상관없이 투약	669905840 663원	30정/병 100정/병	<b>C10AA05</b> 전문 218 동맥경화용제
	<b>뉴토르정 20mg</b> Atorvastatin calcium 21.69mg (as Atorvastatin 20mg)	1. 다음의 심장혈관 질환에 대한 위험성감소 1) 관상동맥 심장 질환에 대한 임상적 증거는 없으나, 관상동맥 심장 질환의 다중위험요소가 있는 성인 환자의 (1) 심근경색증에 대한 위험성 감소 (2) 뇌졸중에 대한 위험성 감소 (3) 혈관재생술 및 만성 안정형 협심증에 대한 위험성 감소 2. 고지혈증 등  * 자세한 내용은 설명서 참조	1일 1회 10mg~80mg의 용량범위로 투여 하루 중 아무 때나 음식물과 상관없이 투약	669906010 712원	30정/병 100정/병	<b>C10AA05</b> 전문 218 동맥경화용제
	<b>뉴토젯정 10/10mg</b> Ezetimibe 10mg / Atorvastatin Calcium Trihydrate 10.85mg (as Atorvastatin 10mg)	1. 원발성 고콜레스테롤혈증 2. 동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증(HoFH)  * 자세한 내용은 설명서 참조	식사와 관계없이 1일 1회 투여 *원발성 고콜레스테롤혈증: 초회량 1일 10/10 mg 또는 10/20mg 권장, 용량범위 1일 10/10mg - 10/80mg *동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증: 1일 10/40 mg 또는 10/80mg 권장  * 자세한 내용은 설명서 참조	669908090 637원	30정 (10정 /PTPx3)	<b>C10BA05</b> 전문 218 동맥경화용제
	<b>뉴토젯정 10/20mg</b> Ezetimibe 10mg / Atorvastatin Calcium Trihydrate 21.7mg (as Atorvastatin 20mg)	1. 원발성 고콜레스테롤혈증 2. 동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증(HoFH)  * 자세한 내용은 설명서 참조	식사와 관계없이 1일 1회 투여 *원발성 고콜레스테롤혈증: 초회량 1일 10/10 mg 또는 10/20mg 권장, 용량범위 1일 10/10mg - 10/80mg *동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증: 1일 10/40 mg 또는 10/80mg 권장  * 자세한 내용은 설명서 참조	669908070 808원	30정 (10정 /PTPx3)	<b>C10BA05</b> 전문 218 동맥경화용제
	<b>뉴토메가연질캡슐 5/1000mg</b> Atorvastatin Calcium Trihydrate 5.425mg (as Atorvastatin 5mg) / Omega-3-acid Ethyl Esters 90 (1000mg)	관상동맥심질환(CHD) 고위험이 있는 성인 환자에서 아토르바스타틴 20mg 단일치료 요법 시 LDL-콜레스테롤 수치는 적절히 조절되지만 트리글리세라이드 수치가 적절히 조절되지 않는 복합형(IIIb) 이상지질혈증의 치료	성인: 1일 1회 4캡슐 위장장애를 피하기 위해 식사와 함께 투여.	669908310 739원	80캡슐 (8캡슐 /Alu -Alu*8)	<b>C10BA08</b> 전문 218 동맥경화용제

\* 각 제품의 효능 효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.  
\* 약가(상한금액)은 2025년 1월 2일 기준이며 향후 변동될 수 있습니다.

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>뉴스토정</b> 10mg Rosuvastatin calcium 10.4mg (as Rosuvastatin 10mg)	1. 원발성 고콜레스테롤혈증(이형접합 가족성 고콜레스테롤혈증을 포함하는 type IIa), 복합형 고지혈증(type IIb) 2. 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증  *자세한 내용은 설명서 참조	1. 원발성 고콜레스테롤혈증(이형접합 가족성 고콜레스테롤혈증을 포함하는 type IIa), 복합형 고지혈증(type IIb) 원발성 이상베타리포프로테인 혈증 (type III) 및 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증 : 1일 1회 10~20mg 2. 이형 가족형 고콜레스테롤혈증 소아환자 (만10세 ~ 만17세) : 1일 1회 5~20mg  * 자세한 내용은 설명서 참조	669906020 612원	30정/병	<b>C10AA07</b> 전문 218 동맥경화용제
	<b>뉴스토정</b> 20mg Rosuvastatin calcium 20.8mg (as Rosuvastatin 20mg)			669907310 686원		
	<b>뉴바로정</b> 2mg Pitavastatin Calcium 2mg	원발성 고콜레스테롤혈 증 및 혼합형 이상지질 혈증의 상승된 총 콜레스테롤, LDL- 콜레스테롤, 아포- B 단백질 및 트 리글리세라이드치 감소 시키고 HDL- 콜레스테롤을 증가시키는 식이 요법 보조제	성인: 1일 1회 1정, 1일 최대 4mg	669906460 477원	30정/병 100정/병	<b>C10AA08</b> 전문 218 동맥경화용제
	<b>엔피토린정</b> 10/10mg Ezetimibe 10mg / Simvastatin 10mg	1. 원발성 고콜레스테롤혈증 2. 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증  *자세한 내용은 설명서 참조	1일 1회 1정, 저녁에 투여 식사와 관계없이 투여	669906750 666원	30정 (10정 /PTP×3)	<b>C10BA02</b> 전문 218 동맥경화용제
	<b>엔피토린정</b> 10/20mg Ezetimibe 10mg / Simvastatin 20mg			669906620 931원		
	<b>뉴피도정</b> Clopidogrel 75mg	1. 허혈뇌졸중, 심근경색 또는 말초동맥성 질환이 있는 성인에서 죽상동맥경화성 증상의 개선 2. 급성관상동맥증후군이 있는 성인에서 죽상동맥경화성 증상의 개선 3. 한 가지 이상의 혈관성 위험인자를 가지고 있고, 비타민 K 길항제 투여가 적합하지 않으며, 출혈 위험이 낮은 심방세동에서 뇌졸중을 포함한 죽상혈전증 및 혈전색전증의 위험성 감소	성인: 1. 허혈뇌졸중, 심근경색, 말초동맥성 질환: 1일 1회 75mg 2. 급성관상동맥증후군: 부하용량 1일 1회 300mg. 유지용량 1일 1회 75mg. 1일 1회 아스피린 75-325mg 병용. 3. 심방세동: 1일 1회 75mg. 1일 1회 아스피린 75-100mg 병용.	669906370 1,164원	30정/병 100정/병	<b>B01AC04</b> 전문 218 동맥경화용제

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>뉴포그릴SR정</b> 300mg Sarpogrelate HCl 300mg (속방부 100mg, 서방부 200mg)	만성 동맥폐색증(버거씨병, 폐색성동맥경화증, 당뇨병성말 초혈 관병증 등)에 의한 궤양, 통증 및 냉감 등의 허혈성 증상 개선	1일 1회 식후 경구 투여 씹거나 부수지 말고 그대로 복용	669907450 858원	30정/병 100정/병	<b>B01AC</b> 전문 339 기타의 혈액 및 체액용약
	<b>실로탈서방캡슐</b> 100mg Cilostazol 100mg	1. 만성동맥폐색증(버거씨병, 폐색성 동맥경화증, 당뇨병 성 말초혈관 병증 등)에 따른 궤양, 동통 및 냉감 등 허혈성 증상상의 개선 2. 뇌경색(심인성뇌색전증 제외) 발증 후 재발억제	성인 1일 1회 200mg, 공복시 복용	669907770 445원	30캡슐/병	<b>B01AC23</b> 전문 339 기타의 혈액 및 체액용약
	<b>실로탈서방캡슐</b> 200mg Cilostazol 200mg			669907780 889원		
	<b>리마글란정</b> Limaprost 5 $\mu$ g	1. 폐색성혈전혈관염에 의한 궤양, 동통, 냉감 등의 허혈성 증상상의 개선 2. 후천성 요부척추관협착증에 의한 자각증상 및 보행능력의 개선	1. 폐색성혈전혈관염에 의한 궤양, 동통, 냉감 등 허혈성 증상 개선: 성인 1회 2정, 1일 3회. 2. 후천성 요부척추관협착증(SLR 정상, 양측성 간헐파행)에 의한 자각증상(하지동통, 하지저림) 및 보행능력 개선: 성인 1회 1정, 1일 3회	669906720 274원	84정 (21정 /Alu -Alu*4)	<b>B01AC28</b> 전문 219 기타의 순환계용약
	<b>메타진정</b> Trimetazidine HCl 20mg	1차 항협심증 치료제로 적절히 조절되지 않거나, 내약성이 없는 안정형 협심증 환자의 증상적 치료를 위한 병용 요법	1일 3회, 1회 1정 식사시 복용 중등도의 신기능 장애 (크레아티닌 클리어런스 30-60 ml/min) 환자 : 1일 2회, 1회 1정 아침, 저녁 식사시 복용	669901470 77원	30정/병 300정/병	<b>C01EB15</b> 전문 217 혈관확장제

\* 각 제품의 효능 효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.  
\* 약가(상환금액)은 2025년 1월 2일 기준이며 향후 변동될 수 있습니다.




제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>엔피다파정</b> 10mg Dapagliflozin propanediol hydrate 12.3mg (10mg as dapagliflozin)	이 약은 제 2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여한다. - 단독요법 - 병용요법	식사와 관계없이 1일 1회 1정	669908220 393원	28정 (14정 /PTPx2)	<b>A10BK01</b> 전문 396 당뇨병용제
	<b>다파포민서방정</b> 10/500mg Dapagliflozin propanediol hydrate 12.3mg (10mg as dapagliflozin), Metformin hydrochloride 500mg	다파글리플로진과 메트포르민의 병용투여가 적합한 성인 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로서 투여	저녁식사와 함께 1일 1회 1정 투여	669908340 473원	30정 (6정 /Alu-Alu*5)	<b>A10BD15</b> 전문 396 당뇨병용제
	<b>다파포민서방정</b> 10/1000mg Dapagliflozin propanediol hydrate 12.3mg (10mg as dapagliflozin), Metformin hydrochloride 1000mg	다파글리플로진과 메트포르민의 병용투여가 적합한 성인 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로서 투여	저녁식사와 함께 1일 1회 1정 투여	669908330 512원	30정 (6정 /Alu-Alu*5)	<b>A10BD15</b> 전문 396 당뇨병용제
	<b>시타틴알파정</b> 50mg Sitagliptin hydrochloride hydrate 56.69mg (50mg as Sitagliptin)	제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여한다.	1일 1회 1일 최대용량: 100 mg	669908000 301원	30정 (10정 /PTPx3)	<b>A10BH01</b> 전문 396 당뇨병용제
	<b>시타틴알파정</b> 100mg Sitagliptin hydrochloride hydrate 113.37mg (100mg as Sitagliptin)	제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여한다.	1일 1회 1일 최대용량: 100 mg	669907990 453원	30정 (10정 /PTPx3)	<b>A10BH01</b> 전문 396 당뇨병용제
	<b>시타포민알파정</b> 50/500mg Sitagliptin hydrochloride hydrate 56.69mg (50mg as Sitagliptin) / Metformin HCl 500mg	제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여한다.	식사와 함께, 1일 2회 1일 최대용량: 시타글립틴 100mg, 메트포르민 2000mg	669908240 371원	30정 (10정 /PTPx3)	<b>A10BD07</b> 전문 396 당뇨병용제
	<b>시타포민알파정</b> 50/850mg Sitagliptin hydrochloride hydrate 56.69mg (50mg as Sitagliptin) / Metformin HCl 850mg	제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여한다.	식사와 함께, 1일 2회 1일 최대용량: 시타글립틴 100mg, 메트포르민 2000mg	669908250 371원	30정 (10정 /PTPx3)	<b>A10BD07</b> 전문 396 당뇨병용제
	<b>시타포민알파정</b> 50/1000mg Sitagliptin hydrochloride hydrate 56.69mg (50mg as Sitagliptin) / Metformin HCl 1000mg	제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여한다.	식사와 함께, 1일 2회 1일 최대용량: 시타글립틴 100mg, 메트포르민 2000mg	669908230 377원	30정 (10정 /PTPx3)	<b>A10BD07</b> 전문 396 당뇨병용제

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>시타포민엑살서방정 50/500mg</b> Sitagliptin hydrochloride hydrate 56.69mg (50mg as Sitagliptin) / Metformin HCl 500mg			669908290 381원		
	<b>시타포민엑살서방정 50/1000mg</b> Sitagliptin hydrochloride hydrate 56.69mg (50mg as Sitagliptin) / Metformin HCl 1000mg	시타글립틴과 메트포르민의 병용투여가 적절한 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여한다.	식사와 함께, 1일 1회 1일 최대용량: 시타글립틴 100 mg, 메트포르민 2000mg	669908270 420원	28정/병	<b>A10BD07</b> 전문 396 당뇨병용제
	<b>시타포민엑살서방정 100/1000mg</b> Sitagliptin hydrochloride hydrate 113.37mg (100mg as Sitagliptin) / Metformin HCl 1000mg			669908280 572원		
	<b>듀오글리정</b> Dapagliflozin Citric Acid (Micronized) 14.7mg (10mg as Dapagliflozin) / Sitagliptin hydrochloride hydrate 113.4mg (100mg as Sitagliptin)	시타글립틴과 다파글리플로진의 병용투여가 적합한 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여한다.	식사와 관계없이, 1일 1회 1정	669908260 846원	30정 (10정/PTP×3)	<b>A10BD29</b> 전문 396 당뇨병용제
	<b>테넬틴정</b> Teneligliptin Hydrochloride Hydrate 26mg (as Teneligliptin 20mg)	성인 제 2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여	식사와 관계없이 1일 1회 1정 신장애 환자에서 용법·용량 조절이 필요하지 않음 경증에서 중증증의 간장애 환자에서 용법·용량 조절이 필요하지 않음	669908160 665원	30정/병 60정/병	<b>A10BH08</b> 전문 396 당뇨병용제
	<b>테넬포민서방정 10/500mg</b> Teneligliptin Hydrochloride Hydrate 13mg (as Teneligliptin 10mg) / Metformin HCl 500mg			669908190 334원		
	<b>테넬포민서방정 10/750mg</b> Teneligliptin Hydrochloride Hydrate 13mg (as Teneligliptin 10mg) / Metformin HCl 750mg	테넬리글립틴과 메트포르민의 병용투여가 적절한 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법 보조제로 투여	식사와 함께 1일 1회 2정 1일 최대용량: 테넬리글립틴 20 mg, 서방정 메트포르민 2000mg	669908170 334원	30정/병	<b>A10BD28</b> 전문 396 당뇨병용제
	<b>테넬포민서방정 20/1000mg</b> Teneligliptin Hydrochloride Hydrate 26mg (as Teneligliptin 20mg) / Metformin HCl 1000mg		식사와 함께 1일 1회 1정	669908180 665원		


\* 각 제품의 효능 효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.  
 \* 약가(상한금액)은 2025년 1월 2일 기준이며 향후 변동될 수 있습니다.

# 내분비계 급여

A 10 16

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>그리자이드정</b> Gliclazide 80mg	제 2형 당뇨병(식이요법, 운동요법으로 충분한 효과를 얻을 수 없는 경우에 한함.)	성인, 1일 40~80mg으로 시작, 1일 1~2회	669900170 82원	30정/병 500정/병	<b>A10BB09</b> 전문 396 당뇨병용제
	<b>게리메트정</b> 2/500mg Glimepiride 2mg / Metformin HCl 500mg	인슐린 비의존성 당뇨병 (제2형)환자에서 식이요법 및 운동요법과 병행하여 - 글리메피리드 또는 메트포르민 단독요법으로 혈당조절효과가 불충분한 경우 - 글리메피리드와 메트포르민 병용요법의 대체	식사직전 또는 식사와 함께 1일 1~2회 투여	669905520 167원	30정/병 100정/병	<b>A10BD02</b> 전문 396 당뇨병용제
	<b>알포익정</b> R-Thioctic Acid Tromethamine 480mg	당뇨병성 다발성 신경염의 완화	1일 1회 1정 충분한 물과 함께 아침식사 약 30분전 복용	669907200 707원	30정/병 100정/병	<b>A16AX01</b> 전문 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품

## NEW


	<b>뉴라젠타정</b> 3월출시 Linagliptin 5mg	제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식이요법 및 운동요법의 보조제로 투여한다.	식사와 관계없이 1일 1회 5mg	669908470 341원	30정/상자 (10정 /Alu-Alu×3)	<b>A10BH05</b> 전문 396 당뇨병용제
---	---	--	-----------------------	-------------------	----------------------------	-----------------------------------

# 소화기계 급여






A 02

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
------	--------------	-------	-------	------------	------	----------------





## 국내최초! 국내유일!

	<b>라피듀오정</b> 10/350mg Rabeprazole sodium 10mg / Magnesium Oxide 350mg	1. 위궤양, 십이지장궤양 2. 미란성 또는 궤양성 위식도역류질환 3. 위식도역류질환의 증상 완화 4. 위식도역류질환의 장기간 유지요법	1. 위궤양, 십이지장궤양: 1일 1회 10/350mg 2. 미란성 또는 궤양성 위식도역류질환: 1일 1회 10/350mg 3. 위식도역류질환의 증상 완화: 1일 1회 10/350mg 4. 위식도역류질환의 장기간 유지요법: 1일 10/350mg	669908360 593원	28정/상자 (14정 /PTP×2)	<b>A02BC54</b> 전문 232 소화성 궤양용제
---	---	--	--	-------------------	------------------------	---




제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>라피졸정</b> 10mg Rabeprazole 10mg	<ol style="list-style-type: none"> <li>위궤양, 십이지장궤양</li> <li>미란성 또는 궤양성 위식도역류질환</li> <li>위식도역류질환의 증상 완화</li> <li>위식도역류질환의 장기간 유지요법</li> <li>헬리코박터필로리에 감염된 소화기 궤양 환자에 대한 항생제 병용요법</li> <li>졸링거 엘리스 증후군</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>위·십이지장궤양 : 1일 1회 10~20mg</li> <li>미란성 또는 궤양성 위식도역류질환 : 1일 1회 10~20mg</li> <li>위식도역류질환 증상 완화 : 1일 1회 10mg</li> <li>위식도역류질환 장기간 유지요법 : 1일 10~20mg</li> <li>헬리코박터필로리 제균 : 본제 20mg+ 클라리트로마이신 500mg+ 아목시실린 1g 1일 2회, 7일간</li> <li>졸링거엘리스증후군: 1일 1회 60~120mg, 100mg까지 1일 1회 투여 가능, 120mg은 60mg씩 1일 2회 분할 투여</li> </ol>	<p>669906270</p> <p>454원</p>	28정/상자 (28정 /PTP×1)	A02BC04 전문 232 소화성 궤양용제
	<b>라피졸정</b> 20mg Rabeprazole 20mg	<ol style="list-style-type: none"> <li>위궤양, 십이지장궤양의 단기치료</li> <li>역류성 식도염 및 위식도 역류질환(GERD)의 증상 (가슴앓이, 토출 등) 치료</li> <li>심한 역류성 식도염과 잘 치료되지 않는 소화성궤양의 유지요법</li> <li>졸링거엘리스 증후군</li> <li>Helicobacter pylori 에 감염된 십이지장궤양의 재발 방지를 위한 항생제 병용요법</li> <li>비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 투여로 인한 위·십이지장궤양 또는 미란의 치료</li> <li>위·십이지장 병변의 병력이 있는 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 장기투여 환자에서 NSAID 투여로 인한 위·십이지장궤양 또는 미란 및 소화불량증상의 예방</li> <li>역류성식도염의 재발방지</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1일 1회, 1회 1캡슐</li> <li>졸링거-엘리스증후군의 치료 : 1일 1회, 1회 60mg~120mg. 1일 80mg 이상 투여할 경우 1일 2회 분할 투여</li> <li>역류성식도염의 재발방지 : 1일 1회, 1회 10mg</li> </ol>	<p>669906260</p> <p>909원</p>	28정/상자 (28정 /PTP×1)	A02BC04 전문 232 소화성 궤양용제
	<b>대한뉴팜 오메프라졸캡슐</b> Omeprazole 20mg	<ol style="list-style-type: none"> <li>위궤양, 십이지장궤양의 단기치료</li> <li>역류성 식도염 및 위식도 역류질환(GERD)의 증상 (가슴앓이, 토출 등) 치료</li> <li>심한 역류성 식도염과 잘 치료되지 않는 소화성궤양의 유지요법</li> <li>졸링거엘리스 증후군</li> <li>Helicobacter pylori 에 감염된 십이지장궤양의 재발 방지를 위한 항생제 병용요법</li> <li>비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 투여로 인한 위·십이지장궤양 또는 미란의 치료</li> <li>위·십이지장 병변의 병력이 있는 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 장기투여 환자에서 NSAID 투여로 인한 위·십이지장궤양 또는 미란 및 소화불량증상의 예방</li> <li>역류성식도염의 재발방지</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1일 1회, 1회 1캡슐</li> <li>졸링거-엘리스증후군의 치료 : 1일 1회, 1회 60mg~120mg. 1일 80mg 이상 투여할 경우 1일 2회 분할 투여</li> <li>역류성식도염의 재발방지 : 1일 1회, 1회 10mg</li> </ol>	<p>669900700</p> <p>671원</p>	28캡슐/병 300캡슐/병	A02BC01 전문 232 소화성 궤양용제
	<b>에스오엠정</b> 20mg Esomeprazole 20mg	<ol style="list-style-type: none"> <li>위식도 역류질환(GERD)</li> <li>헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제 병용요법</li> <li>비스테로이드소염진통제 (COX-2 비선택성, 선택성) 투여와 관련된 상부 위장관 증상(통증, 불편감, 작열감) 치료의 단기요법</li> <li>지속적인 비스테로이드소염진통제 투여가 필요한 환자</li> <li>졸링거-엘리스 증후군의 치료</li> <li>정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후의 유지 요법</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1일 1회, 1회 20~40mg 투여</li> <li>졸링거-엘리스증후군의 치료 : 1일 2회 40~80mg</li> </ol>	<p>669906390</p> <p>649원</p>	28정 (14정 /Alu -Alu*2)	A02BC05 전문 232 소화성 궤양용제
	<b>에스오엠정</b> 40mg Esomeprazole 40mg	<ol style="list-style-type: none"> <li>위식도 역류질환(GERD)</li> <li>헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제 병용요법</li> <li>비스테로이드소염진통제 (COX-2 비선택성, 선택성) 투여와 관련된 상부 위장관 증상(통증, 불편감, 작열감) 치료의 단기요법</li> <li>지속적인 비스테로이드소염진통제 투여가 필요한 환자</li> <li>졸링거-엘리스 증후군의 치료</li> <li>정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후의 유지 요법</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1일 1회, 1회 20~40mg 투여</li> <li>졸링거-엘리스증후군의 치료 : 1일 2회 40~80mg</li> </ol>	<p>669906410</p> <p>1,078원</p>	28정 (14정 /Alu -Alu*2)	A02BC05 전문 232 소화성 궤양용제

\* 각 제품의 효능 효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.  
\* 약가(상한금액)은 2025년 1월 2일 기준이며 향후 변동될 수 있습니다.

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 시약처분류
	<b>파밀란정</b> 20mg Famotidine 20mg	위·십이지장궤양, 문합부궤양, 상부소화관출혈(소화성궤양, 급성스트레스궤양, 출혈성위염에 의한), 역류성식도염, Zollinger-Elly 증후군, 다음 질환의 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기	1. 위·십이지장궤양, 문합부궤양, 상부소화관출혈 (소화성궤양, 급성스트레스 궤양, 출혈성궤양에 의한), 역류성식도염, Zollinger-Elly 증후군: 1회 20mg 1일 2회 또는 1일 1회 40mg 2. 급성위염, 만성위염의 급성악화기 위점막병변 (미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 1회 10mg 1일 2회 또는 1일 1회 20mg	669907870 161원	30정/병 300정/병	<b>A02BA03</b> 전문 232 소화성 궤양용제
	<b>뉴잔틴캡슐</b> 150mg Nizatidine 150mg	1. 활동성 위·십이지장 궤양 치료 및 십이지장 궤양 재발방지 2. 내시경상으로 진단된 미란성 및 궤양성 식도염, 위식도 역류질환(GERD)에 기인한 가슴쓰림(heart burn) 증상의 치료 3. 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성위염, 만성위염의 급성악화기	1. 활동성 위·십이지장궤양: 1일 1회(취침시) 300mg 또는 1회 150mg 1일 2회 2. 십이지장궤양 재발방지: 1일 1회(취침시) 150mg 3. 위식도역류질환: 1회 150mg 1일 2회 4. 위점막병변 개선: 1회 150mg 1일 2회	669906420 303원	30캡슐/병 300캡슐/병	<b>A02BA04</b> 전문 232 소화성 궤양용제
	<b>뉴토가정</b> 10mg Lafutidine 10mg	1. 위궤양, 십이지장 궤양 2. 급성위염 및 만성위염의 위점막병변의 개선 3. Helicobacter pylori에 감염된 소화성 궤양 환자에 대한 항생제 병용요법 4. 마취전 투약 5. 역류성 식도염 치료	1. 위궤양의 단기치료 : 1회 10mg, 1일 2회 오전 및 취침전에 경구 투여 2. 십이지장궤양의 단기치료 : 1회 10mg, 1일 2회 오전 및 취침전에 경구 투여 3. 급성위염 및 만성위염의 위점막 병변의 개선 : 1일 1회 10mg을 취침전 경구 투여 4. Helicobacter pylori에 감염된 소화성 궤양 환자에 대한 항생제 병용요법 : 라푸티딘 20mg, 클래리스로마이신 500mg, 아목시실린 1000mg을 1일 2회 7일간 또는 14일간 투여 5. 마취전투약: 1회 10mg을 2회 (수술전날 취침전, 수술당일 마취투여 2시간전) 경구 투여 6. 역류성 식도염 치료: 1회 10mg, 1일 2회 경구 투여	669906450 132원	30정/병 300정/병	<b>A02BA08</b> 전문 232 소화성 궤양용제
	<b>무코란정</b> 100mg Rebamipide 100mg	1. 위궤양 2. 다음 질환의 위점막병변 (미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기	1회 100mg을 1일 3회 경구투여 위궤양의 경우에는 아침, 저녁 및 취침전에 투여	669901570 103원	30정/병 500정/병	<b>A02BX14</b> 전문 232 소화성 궤양용제

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>엔피렌정</b> Artemisia Herb 95% Ethanol Soft Ext.(20→1) 60mg	1. 다음 질환의 위점막 병변 (미란(짓무름), 출혈, 발적, 부종)개선 : 급성위염, 만성위염 2. 비스테로이드소염진통제 (NSAID) 투여로 인한 위염의 예방	1회 60mg을 1일 3회	669906150 105원	30정/병 500정/병	<b>A02X</b> 전문 232 소화성 궤양용제
	<b>엔피렌에스정</b> Artemisia Herb 95% Ethanol Soft Ext.(20→1) 90mg	다음 질환의 위점막 병변(미란(짓무름), 출혈, 발적, 부종) 개선 : 급성위염, 만성위염	1회 90mg을 1일 2회 식후	669907300 174원	30정/병 300정/병	<b>A02X</b> 전문 232 소화성 궤양용제
	<b>티파론정</b> Tiropramide HCl 100mg	1. 간담도 산통·여러 원인에 의한 복부산통·신장·요관의 산통에서의 급성 경련성 동통 2. 위장관 이상운동증·담석증·담낭염·수술후 유착에서의 복부경련 및 동통	성인: 1회 100mg, 1일 2-3회	669904070 135원	30정/병 500정/병	<b>A03AC05</b> 전문 124 진경제
	<b>레보란정</b> Levosulpiride 25mg	기능성소화불량으로 인한 다음 증상의 완화: 복부팽만감, 상복부불쾌감, 속쓰림, 트림, 구역, 구토	성인: 1회 25mg, 1일 3회 (식전)	669901040 119원	30정/병 500정/병	<b>A03FA</b> 전문 239 기타의 소화기관용약
	<b>모사가틴정</b> Mosapride citrate hydrate 5mg	기능성소화불량으로 인한 소화기증상(속쓰림, 구역, 구토)	1일 15mg을 3회로 나누어 식전 또는 식후에 경구투여	669906080 103원	30정/병 300정/병	<b>A03FA09</b> 전문 239 기타의 소화기관용약

NEW

	<b>상반기 출시예정</b> <b>아시토바캡슐 300mg</b> Lactobacillus acidophilus 300mg	정장, 변비, 묽은 변, 복부팽만감, 장내 이상발효	1. 성인 및 12세 이상의 소아 : 1회 300 mg (생균수로서 1×10 <sup>8</sup> 개) 을 1일 1-3회 복용 2. 8세 이상 12세 미만의 소아: 1회 300 mg (생균수로서 1×10 <sup>8</sup> 개) 을 1일 1-2회 복용	669902600 117원	300캡슐/병	<b>A07FA01</b> 전문 237 정장제
---	---	------------------------------	--	-------------------	---------	------------------------------

\* 각 제품의 효능 효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.  
\* 약가(상한금액)은 2025년 1월 2일 기준이며 향후 변동될 수 있습니다.


제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>뉴페신정</b> 5mg Solifenacin succinate 5mg	절박성 뇨실금, 빈뇨, 요절박과 같은 과민성 방광 증상의 치료	성인 1일 1회 5mg, 1일 1회 최대 10mg	669906180 454원	100정 (10정 /PTP×10)	<b>G04BD08</b> 전문 259 기타의 비뇨생식기관 및 항문용약
	<b>타로신서방정</b> 0.2mg Tamsulosin HCl 0.2mg	양성 전립샘비대증에 따른 배뇨장애	성인: 1일 1회 1정	669906360 465원	30정/병 100정/병	<b>G04CA02</b> 전문 259 기타의 비뇨생식기관 및 항문용약
	<b>타로신서방정</b> 0.4mg Tamsulosin HCl 0.4mg			669907910 675원		
	<b>테트린정</b> 2mg Terazosin HCl 2.347mg (as Terazosin 2mg)	양성전립선비대증에 의한 배뇨장애, 고혈압 (경증~중증도)	1. 양성전립선비대증에 의한 배뇨장애 1)초회량 : 취침전 1mg을 경구투여 2)유지량 : 1일 1회 5-10mg을 경구투여 2. 고혈압 1)초회량 : 취침전 1mg을 경구투여 2)유지량 : 1일 1회 2-10mg을 아침 또는 저녁에 투여	669903960 303원	30정/병 100정/병	<b>G04CA03</b> 전문 259 기타의 비뇨생식기관 및 항문용약
	<b>엔피스카정</b> Finasteride 5mg	양성전립샘비대증: 양성전립샘비대증 증상 개선, 비후된 전립샘 퇴행 및 요류 개선, 급성 요폐 발생빈도 감소, 전립샘 경요도 절제술 및 전립샘 절제수술 등 수술의 필요성 감소	식사 관계없이 1일 1회 5mg, 복용 시 증상이 개선되더라도 최소 6개월간 치료  * 자세한 내용은 설명서 참조	669906600 622원	30정 (10정 /PTP X 3)	<b>G04CB01</b> 전문 259 기타의 비뇨생식기관 및 항문용약
	<b>엔피다트정</b> Dutasteride 0.5mg	양성전립샘비대증 : 양성전립샘비대증 증상의 개선 급성 요저류 위험성 감소 양성 전립선 비대증과 관련된 수술 필요성 감소 성인 남성 (만 18~50세)의 남성형 탈모 (androgenetic alopecia)의 치료	1일 1회 1정 씹거나 쪼개지 않고 통째로 삼켜 복용 식사와 관계없이 복용	669907260 603원	30정 (10정 /PTP X 3)	<b>G04CB02</b> 전문 259 기타의 비뇨생식기관 및 항문용약

# 부신흔르몬제

급여

H

02

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>히티손정</b> Hydrocortisone 10mg	1. 내분비 장애 : 원발성 및 속발성 만성 부신피질기능 부전증, 급성부신피질기능 부전증, 아급성갑상선염, 갑상선질환에수반되는 악성안구돌출증, 부신피질자극호르몬단독 결핍증, 특발성저혈당증 2. 류마티스성 장애 급성진행 또는 악화를 방지하기 위한 단기 투여용 보조요법 으로서 다음의질환, 만성류 마티스양관절염, 류마티 스열 (류마티스성심염을 포함) 3. 교원성질환 : 홍반성 루푸스 전신성 혈관염(대, 동맥중후군 결절성동맥 주위염다발성 동맥염을포함), 다발성 근염(피부근염), 강피증 * 자세한 내용은 설명서 참조	1일 10~120mg, 1~4회 분할 경구투여	669906160 94원	30정/병 500정/병	<b>H02AB09</b> 전문 245 부신흔르몬제

부신흔르몬제

급여

항바이러스제


급여

# 항바이러스제

급여

J

05

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>팜디악정</b> Famciclovir 250mg	1. 대상포진 바이러스 감염증 2. 생식기포진 감염증의 치료 및 재발성 생식기포진의 억제	성인: 1. 대상포진 감염증: 1회 250mg, 1일 3회 7일간 2. 초발성 생식기포진 감염증: 1회 250mg, 1일 3회 5일간 3. 급성 재발성 생식기포진 감염증: 1회 125mg, 1일 2회 5일간 4. 재발성 생식기포진의 억제: 1회 250mg, 1일 2회	669904110 2,477원	21정/병	<b>J05AB09</b> 전문 629 기타의 화학요법제

Product List

\* 각 제품의 효능 효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.  
 \* 약가(상한금액)은 2025년 1월 2일 기준이며 향후 변동될 수 있습니다.

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 시약처분류
	<b>아목탐정 500mg</b> Amoxicillin hydrate 250mg, Sulbactam pivoxyl 25mg	상기도 감염증 : 중이염, 부비강염, 편도선염, 인두염, 후두염 / 하기도 감염증 : 기관지염, 폐렴 / 상하부요로 감염증 / 피부 및 상처감염증 산부인과 감염증 / 복부 감염증	1회 1~2정, 1일 3회 경구투여	669902510 400원	30정/병 300정/병	<b>J01CR02</b> 전문 618 주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것
	<b>아목클정 375mg</b> Amoxicillin hydrate 250mg, Potassium clavulanate diluted 212.73mg(as Potassium clavulanate)125mg)		성인 및 12세 이상 또는 체중 40 kg 이상 소아 : 1회 250mg/125mg, 1일 3회 8시간마다 경구투여 중증 및 호흡기 감염 시 1회 500mg/125mg으로 증량	669905950 300원	80정 (8정 /PTPX10)	
	<b>아목클정 625mg</b> Amoxicillin hydrate 500mg, Potassium clavulanate diluted 212.73mg(as Potassium clavulanate)125mg)	급·만성 기관지염, 대엽성 및 기관지 폐렴, 농흉, 폐농양, 편도염, 부비동염, 중이염, 방광염, 요도염, 신우신염, 골반감염, 임질, 종기 및 농양, 연조직염, 상처감염, 골수염, 치과감염		669905960 483원	40정 (4정 /PTPX10)	<b>J01CR02</b> 전문 618 주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것
	<b>아목클시럽 (7:1)</b> Amoxicillin hydrate 36.3143g/100g, Potassium clavulanate diluted 5.1878g/100g		경·중등도 감염 : 1일 체중 Kg당 25mg/3.6mg 을 2회 나누어 복용 중증감염 : 1일 체중 Kg당 45mg/6.4mg 을 2회 나누어 복용	669906001 69원	50mL/병	
	<b>사프딘캡슐 500mg</b> Cephadrine hydrate 500mg	편도염, 인두염, 대엽성폐렴, 기관지염, 방광염, 신우신염, 요도염, 전립선염, 농양, 연조직염, 종기, 농가진, 중이염	피부 및 연조직, 호흡기 감염증 : 1회 250mg~500mg, 1일 4회 또는 500mg~1g, 1일 2회 경구투여 요로감염증 : 1회 1캡슐, 1일 2회	669901920 205원	30캡슐/병 500캡슐/병	<b>J01DB09</b> 전문 618 주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것
	<b>세플러캡슐</b> Cefaclor 250mg	중이염, 폐렴, 인후두염, 편도염, 기관지염, 신우신염, 방광염, 임균성 요도염, 부스럼, 옹종, 모낭염, 연조직염, 감염성 족종, 피하농양, 생인손, 창상감염	1. 1회 1캡슐, 8시간마다 2. 중증 감염시 1회 2캡슐	669902150 438원	30캡슐/병 500캡슐/병	<b>J01DC04</b> 전문 618 주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>록시티로신정</b> Roxithromycin 150mg	인후두염, 급성기관지염, 편도염, 세균성폐렴, 미코플라스마폐렴 등 호흡기 감염증, 임균에 의한 감염을 제외한 생식기감염증 및 성병, 중이염, 부비동염, 모낭염, 종기, 종기증, 응종, 단독, 연조직염, 림프관(절)염, 생인손, 화농성 손발톱주위염, 피하농양, 한선염, 응괴성 여드름, 감염성 죽종, 수막염균성 수막염환자와 접촉한 경우에 감염 예방 목적, 치관주위염, 치주조직염	1회 150mg(역가)을 1일 2회 아침, 저녁 식전에 경구투여 폐렴의 경우 1일 1회 300mg(역가)을 아침 식전에 투여	669901130 376원	30정/병 500정/병	<b>J01FA06</b> 전문 614 주로 그람양성균, 리케치아, 바이러스에 작용하는 것
	<b>클래마신정</b> Clarithromycin 250mg	하기도감염증 : 기관지염, 폐렴 등 상기도감염증 : 인두염, 부비동염 등 피부 및 피부조직 감염증 미코박테륨 아비움, 미코박테륨 인트라셀룰라에 기인한 미코박테리아 감염증 십이지장궤양 환자의 헬리코박터 파일로리 박멸	1. 12세 이상: 1회 250mg(역가) 1일 2회. 중증 감염증에 1회 500mg(역가), 1일 2회. 7-14일 2. 미코박테리아 감염증: 1회 500mg(역가), 1일 2회. 타항미코박테리아제와 병용해야 함 3. 십이지장궤양 환자의 헬리코박터 파일로리 박멸: 클래리트로마이신은 1회 500mg(역가) 1일 3회 14일간(1-14일), 오메프라졸을 1일 1회 40mg을 28일간(1-28일) 4. 12세 미만: 클래리스로마이신 건조시럽 사용.	669906310 865원	30정/병 100정/병	<b>J01FA09</b> 전문 619 기타의 항생물질 제제
	<b>클래마신정 500mg</b> Clarithromycin 500mg	하기도감염증 : 기관지염, 폐렴 등 상기도감염증 : 인두염, 편도염, 부비동염 등 급성 중이염 피부 및 피부조직 감염증 미코박테륨 아비움 또는 미코박테륨 인트라셀룰라에 기인한 미코박테리아 감염증	* 자세한 내용은 설명서 참조	669906850 1,291원	30정/병 200정/병	
	<b>클래마신건조시럽 125mg/5mL</b> Clarithromycin Coated Gr. 84.45mg/g (as Clarithromycin 35.47mg/g)	하기도감염증 : 기관지염, 폐렴 등 상기도감염증 : 인두염, 편도염, 부비동염 등 급성 중이염 피부 및 피부조직 감염증 미코박테륨 아비움 또는 미코박테륨 인트라셀룰라에 기인한 미코박테리아 감염증	1. 소아: 7.5mg/kg 12시간마다, 5-10일간, 식사와 관계없이 투여 2. 마이코박테리아 감염증: 소아 7.5-15mg/kg, 12시간마다 투여. 타항마이코박테리아제와 병용해야 함. 최대용량: 1회 500mg, 1일 2회.	669907281 85원	100mL/병	<b>J01FA09</b> 전문 619 기타의 항생물질 제제
	<b>클래마신건조시럽 250mg/5mL</b> Clarithromycin Coated Gr. 153.54mg/g (as Clarithromycin 64.49mg/g)	하기도감염증 : 기관지염, 폐렴 등 상기도감염증 : 인두염, 편도염, 부비동염 등 급성 중이염 피부 및 피부조직 감염증 미코박테륨 아비움 또는 미코박테륨 인트라셀룰라에 기인한 미코박테리아 감염증	* 자세한 내용은 설명서 참조	669907291 127원	70mL/병	

\* 각 제품의 효능 효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.  
\* 약가(상한금액)는 2025년 1월 2일 기준이며 향후 변동될 수 있습니다.



제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>에프로신정</b> Ciprofloxacin HCl 291mg (as Ciprofloxacin 250mg)	급성 기관지염을 제외한 호흡기감염증, 지역사회감염폐렴, 귀.코.인후감염(인두염, 편도선염, 후두염, 외이염), 만성진주층성중이염 및 빠르게 전이된 만성중이염에 대한 수술 전 사용은 제외), 세균성 전립선염, 급성단순방광염, 급성신우신염, 복잡성요로감염, 임균성 자궁경부염 및 임균성 요도염, 위장관감염증, 담즙분비관의 감염증, 피부 및 연조직의 감염증과 상처, 골.관절의 감염증, 산부인과적 감염증(질감염은 제외), 복막염, 누낭염, 맥립종(다래끼), 검판선염	1회 250~500mg, 1일 2회 식간에 경구 투여 중증 복합감염 : 1회 750mg, 1일 2회로 증량 급성감염 : 보통 5~10일간 치료, 증세가 사라진 후에도 최소한 3일간 더 투여	669902830 444원	30정/병 500정/병	<b>J01MA02</b> 전문 629 기타의 화학요법제
	<b>레비신정</b> Levofloxacin hydrate 100mg	복잡성 피부 및 연조직의 감염, 만성 기관지염, 미만성 범세기관지염, 만성호흡기질환의 2차감염, 지역사회감염폐렴, 기관지확장증(감염시), 급성신우신염, 방광염, 전립선염, 임균성요도염, 비임균성요도염, 부고환염, 세균성 이질, 장염, 자궁부속기염, 자궁내감염, 바르톨린샘염, 눈꺼풀염, 다래끼, 누낭염, 검판선염, 각막궤양, 중이염(만성진주층성중이염 및 빠르게 전이된 만성중이염에 대한 수술 전 사용은 제외), 부비동염, 치주조직염, 악염, 담낭염, 담관염	1회 100mg을 1일 2~3회 경구투여 중증 또는 효과가 불충분한 환자 : 1회 200mg, 1일 3회 투여	669901050 567원	30정/병 200정/병	<b>J01MA12</b> 전문 629 기타의 화학요법제

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드	포장단위	ATC코드
				약가		식약처분류



**푸즐캡슐**  
Fluconazole 50mg

1. 급성 또는 재발성 질칸디다증  
2. 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자의 구강 인두, 식도, 비침습성 기관지 폐감염과 칸디다노증, 피부점막 및 만성위축성 구강칸디다증 (의치로 인한 구강내 통증) 등을 포함한 점막 칸디다증  
3. 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신 칸디다증

\* 자세한 내용은 설명서 참조

1. 질칸디다증 : 1회 150mg 단회 경구투여  
2. 점막 칸디다증  
1) 구강 인두 칸디다증 : 1일 1회 50mg  
2) 만성 위축성 구강칸디다증 : 1일 1회 50mg  
3) 기타 점막 칸디다증 : 1일 1회 50mg 투여.  
난치성 점막 칸디다증의 경우 1일 1회 100mg으로 증량  
3. 칸디다혈증, 파종성 칸디다증 및 그 외의 침습성 칸디다 감염증을 포함한 전신칸디다증 : 첫날 400mg을 1회 투여. 다음날부터 1일 1회 200mg을 투여하며, 1일 1회 400mg까지 증량

\* 자세한 내용은 설명서 참조

669904220  
1,784원

30캡슐/병  
100캡슐/병

**J02AC01**  
전문 629  
기타의  
화학요법제



**이코졸정**  
Itraconazole Solid Dispersions 253mg (as Itraconazole 100mg)

1. 칸디다성 질염  
2. 어루러기  
3. 피부사상균에 의한 체부백선, 고부백선(완선), 수부백선, 족부백선  
4. 구강칸디다증  
5. 진균성각막염  
6. 손·발톱진균증  
7. 다음과 같은 전신진균감염증 :  
아스페르길루스증, 칸디다증, 크립토코쿠스증(크립토코쿠스 수막염 포함), 파라코시디오이드미시스증

식사 직후 투여  
1. 단기투여:  
1) 칸디다성 질염: 1회 200mg 1일 2회 1일간 또는 1일 1회 200mg 3일간  
2) 어루러기: 1일 1회 200mg 7일간  
3) 체부·고부(완선)백선, 수부·족부(지간형)백선: 1일 1회 100mg 15일간  
4) 수부(손바닥)·족부(발바닥)백선: 1일 1회 100mg 30일 간 또는 1회 200mg 1일 2회 7일간  
5) 구강칸디다증: 1일 1회 100mg 15일간  
6) 진균성각막염: 1일 1회 200mg 21일간  
2. 손·발톱진균증:  
1) 주기요법: 1회 200mg 1일 2회 1주간 투여 후 3주간 휴약하는 것을 1주기로 손톱감염은 2주기, 발톱감염은 최대 3주기  
2) 연속요법: 1일 1회 200mg 3개월간.  
3. 전신진균감염증 면역기능 저하된 환자 경우 2배로 증량하여 투여.

\* 자세한 내용은 설명서 참조

669905850  
1,078원

28정/병  
100정/병

**J02AC02**  
전문 629  
기타의  
화학요법제

\* 각 제품의 효능 효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.  
\* 약가(상한금액)은 2025년 1월 2일 기준이며 향후 변동될 수 있습니다.

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>에피손정</b> Eperisone HCl 50mg	1. 근골격계질환에 수반하는 동통성 근육연축 : 경견완증후군, 견관절주위염, 요통 2. 신경계 질환에 의한 경직성 마비 : 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술후 후유증(뇌·척수종양 포함), 외상후유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 축색경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애, 아급성 척수시신경병변, 기타의 뇌척수질환	1회 50mg, 1일 3회 식후	669902880 115원	30정/병 500정/병	<b>M03BX09</b> 전문 122 골격근이완제
	<b>에피손SR서방정</b> Eperisone HCl 75mg	근골격계질환에 수반하는 동통성 근육연축 : 경견완증후군, 견관절주위염, 요통	분쇄하거나 분할 또는 씹지 않고 전체를 복용 1일 2회, 1회 1정 식후	669907650 162원	30정/병	<b>M03BX09</b> 전문 122 골격근이완제
	<b>알로본플러스디정</b> Alendronate sodium 91.37mg (as Alendronic acid 70mg) / Cholecalciferol concentrate powder 53.33mg (as Vitamin D3 5,600 I.U.)	폐경 후 여성의 골다공증 치료 남성의 골다공증 치료	1주 1회 1정 아침에 음식물, 음료수 또는 다른 약물 섭취 최소한 30분전에 충분한 양의 물과 함께 복용	669906530 4,528원	4정 (4정 /PTPx1)	<b>M05BB03</b> 전문 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품
	<b>세로본플러스정</b> Risedronate sodium 35mg / Cholecalciferol concentrated powder 56mg (as Cholecalciferol 5,600 I.U.)	폐경 후 여성의 골다공증 치료와 예방, 남성의 골다공증 치료	1정을 매주 1회 경구 투여	669906940 4,556원	4정 (4정 /PTPx1)	<b>M05BB07</b> 전문 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>아세파인정</b> Aceclofenac 100mg	류마티스관절염, 강직척추염, 골관절염(퇴행관절염) 및 견갑상완골의 관절주위염, 치통, 외상 후 생기는 염증, 요통, 좌골통, 비관절성 류머티즘으로 인한 통증	1회 100mg을 12시간마다 1일 2회 복용	669902550 188원	30정/병 500정/병	<b>M01AB16</b>  전문 114 해열, 진통, 소염제
	<b>메록삼캡슐</b> Meloxicam 7.5mg	1. 통증과 운동실조를 수반하는 골관절염(퇴행관절염)의 급성악화시 단기간의 증상치료 2. 류마티스관절염의 증상치료 3. 강직척추염의 증상치료	1. 식사 중 복용. 1일 최대 15mg 2. 골관절염(퇴행관절염) 급성악화: 성인 1일 1회 7.5mg, 필요시 15mg까지 증량가능 3. 류마티스관절염, 강직척추염: 성인 1일 1회 15mg. 치료 반응에 따라 1일 7.5mg로 감량 가능	669905880 230원	30캡슐/병 500캡슐/병	<b>M01AC06</b>  전문 114 해열, 진통, 소염제
	<b>록스파인정</b> Loxoprofen sodium hydrate 68.1mg (as Loxoprofen sodium 60mg)	1. 만성 류마티스관절염, 골관절염, 요통, 견관절주위염, 경견완증후군의 소염·진통 2. 수술후, 외상 후 및 발치 후의 소염·진통 3. 급성 상기도염의 해열·진통(급성기관지염을 수반한 급성 상기도염 포함)	1. 효능·효과 1, 2의 경우 1회 60mg을 1일 3회 경구투여 1회 요법시에는 1회 60~120mg을 경구투여 2. 효능·효과 3의 경우 1회 60mg을 경구투여한다. 원칙적으로 1일 2회, 1일 최대 180mg까지 투여	669901120 125원	30정/병 500정/병	<b>M01AE</b>  전문 114 해열, 진통, 소염제
	<b>덱시파인정</b> Dexibuprofen 300mg	1. 만성 다발성 관절염, 류마티스 관절염 2. 관절증 3. 강직 척추염 4. 외상 및 수술 후 통증성 부종 또는 염증 5. 염증, 통증, 및 발열을 수반하는 감염증의 치료보조)	1회 1정을 1일 2~4회 경구투여 단, 1일 1,200mg을 초과하지 않음	669907820 108원	30정/병 300정/병	<b>M01AE14</b>  전문 114 해열, 진통, 소염제
	<b>셀렉록캡슐</b> 200mg Celecoxib 200mg	1. 골관절염(퇴행관절염)의 증상이나 징후의 완화 2. 류마티스관절염의 증상이나 징후의 완화 3. 강직척추염의 증상 및 징후의 완화 4. 성인의 급성 통증 완화(수술후, 발치후 진통) 5. 원발월경통)	1. 골관절염(퇴행관절염) : 1일 1회 복용 2. 류마티스관절염 : 1회 100mg 또는 200mg을 1일 2회 복용 3. 강직척추염(AS) : 200mg을 1일 1회, 또는 1회 100 mg씩 1일 2회로 나누어 투여. 6 주 후에 효과가 관찰되지 않으면, 1일 400mg 까지 투여 가능. 1일 400mg 투여한지 6주 후에 효과가 관찰되지 않으면, 다른 치료 방법 고려 4. 급성 통증 및 원발월경통 : 초기 권장 투여량은 400mg이며 필요시 투여 첫날에 200mg을 추가로 투여. 투여 둘째 날부터는 필요시 권장량으로서 1회 200mg씩 1일 2회 투여	669906100 443원	30캡슐/병 100캡슐/병	<b>M01AH01</b>  전문 114 해열, 진통, 소염제

\* 각 제품의 효능 효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.  
\* 약가(상한금액)는 2025년 1월 2일 기준이며 향후 변동될 수 있습니다.

# 해열진통소염제

급여

M

01

N

02

해열진통소염제

급여

신경계용제

급여

Product List

2025


제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>모루밍정</b> Morniflumate 350mg	다음 질환 및 증상의 진통·소염 - 호흡기질환(후두염, 기관염, 기관지염) - 이비인후과질환(부비동염, 이염, 편도염, 인두염) - 골관절질환	초회용량으로 1일 2회, 1회 300mg 복용. 환자에 따라 최대 1일 2회, 1회 700mg 까지 복용	669906130 145원	30정/병 300정/병	<b>M01AX22</b> 전문 114 해열, 진통, 소염제
	<b>무파인서방정</b> Acetaminophen 650mg (속방출 325mg, 서방출 325mg) Tramadol HCl 75mg	중등도-중증의 급·만성 통증	1회 1정, 1일 최대 4정 (최소 12시간 간격투여)	669906400 355원	30정/병 100정/병	<b>N02AJ13</b> 전문 114 해열, 진통, 소염제
	<b>무파인세미정</b> Acetaminophen 162.5mg Tramadol HCl 18.75mg		1회 4정, 1일 최대 16정 (최소 6시간 간격투여)	669904800 107원	30정/병 300정/병	
	<b>무파인세미서방정</b> Acetaminophen 325mg (속방출 162.5mg, 서방출 162.5mg) Tramadol HCl 37.5mg		1회 2정, 1일 최대 8정 (최소 12시간 간격투여)	669906380 237원	30정/병 100정/병	

# 신경계용제

급여

N

02



제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>가바텐캡슐 100mg</b> Gabapentin 100mg	1. 간질 1) 단독요법(새롭게 발작으로 진단된 환자의 치료 포함): 만 13세 이상 청소년 혹은 성인에서의 2차적 전신증상을 동반하거나 동반하지 않은 단순/복합 부분발작 2) 부가요법: 만 3세 이상 어린이 혹은 성인에서의 2차적 전신증상을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 2. 신경병증성 통증	1. 간질 1) 만 13세 이상 환자의 단독요법 및 부가요법 - 첫째날: 1일 300mg(가바펜틴 300mg/day) - 둘째날: 1일 600mg(가바펜틴 600mg/day) - 셋째날부터: 1일 900mg(가바펜틴 900mg/day) 2) 만 3세 이상 만 12세 이하 어린이에 대한 부가요법 - 첫째날: 10mg/체중(kg) 투여 - 둘째날: 20mg/체중(kg) 투여 - 셋째날부터: 30mg/체중(kg) 투여 2. 신경병증성 통증 - 첫째날: 1일 300mg(가바펜틴 300mg/day) - 둘째날: 1일 600mg(가바펜틴 600mg/day) - 셋째날부터: 1일 900mg(가바펜틴 900mg/day)	669907460 168원	30캡슐/병 100캡슐/병	<b>N02BF01</b> 전문 113 항전간제

# 신경계용제

급여

N

06

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>엔피셉트정</b> 5mg Donepezil HCl 5mg	알츠하이머형 치매증상의 치료	1일 1회 5mg 취침전 투여 4~6주간은 5mg 용량을 투여하고 이 기간 동안의 임상적 반응을 평가한 후 10mg까지 증량 가능 저체중인 85세 이상 여성 환자 : 저체중 고령 여성은 1일 5 mg을 넘지 않아야 함	669906730 1,751원	30정/병	<b>N06DA02</b> 전문 119 기타의 중추신경용약
	<b>엔피셉트정</b> 10mg Donepezil HCl 10mg			669906610 2,091원		

신경계용제




급여

# 항히스타민제

급여

R

06

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>레보티진정</b> Levocetirizine HCl 5mg	다음 질환의 증상 완화 1. 계절성 알레르기성 비염 또는 다년성 알레르기성 비염 (지속적 알레르기성 비염포함) 2. 만성 특발성 두드러기 3. 가려움증을 동반한 피부염 및 습진(하이드로코티손 외용제와 병용)	6세 이상: 식사와 관계없이 1일 1회 1정	669906090 179원	30정/병 300정/병	<b>R06AE09</b> 전문 141 항히스타민제
	<b>베포타틴정</b> Bepotastine besilate 10mg	다년성 알레르기성 비염, 만성 두드러기, 피부질환에 수반된 소양증(습진, 피부염, 피부소양증, 양진)	1회 10mg을 1일 2회	669906930 126원	30정/병 300정/병	<b>R06AX</b> 전문 141 항히스타민제
	<b>아젤라스정</b> Azelastine HCl 1mg	기관지 천식, 알레르기성비염, 두드러기, 습진, 피부염, 아토피성 피부염, 피부소양증, 가려움	1. 1회 1정. 2. 기관지 천식인 경우 1회 2mg, 1일 2회 (아침식후 및 취침 전)	669906050 150원	30정/병 300정/병	<b>R06AX19</b> 전문 149 기타의 알레르기용약

항히스타민제

급여




\* 각 제품의 효능 효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.  
\* 약가(상한금액)은 2025년 1월 2일 기준이며 향후 변동될 수 있습니다.

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>헤데란시럽</b> Hedera Fluid Ext. 20mg/mL	만성 염증성 기관지 질환의 증상 개선, 기침을 동반한 호흡기의 급성 염증 완화	성인 및 15세 이상 : 1회 100mg을 1일 3회 복용 4~14세 : 1회 100mg을 1일 2회 복용 2~3세 : 1회 50mg을 1일 3회 복용	669904421 34원	500mL/병	<b>R05CA12</b> 일반 222 진해거담제
	<b>뮤시딘캡슐 200mg</b> Acetylcysteine 200mg	다음 질환에서의 객담배출곤란 : 급·만성기관지염, 기관지천식, 후두염, 부비동염, 낭성섬유증	1. 급성질환 성인 : 1회 200mg, 1일 3회 소아 : 6~14세 1회 200mg, 1일 2회 2. 만성질환 성인 : 1회 200mg, 1일 2회 소아 : 6~14세 1회 100mg, 1일 3회 3. 낭성섬유증 소아 : 6세 이상 1회 200mg, 1일 3회	669901590 81원	30캡슐/병 500캡슐/병	<b>R05CB01</b> 일반 222 진해거담제
	<b>에스텐캡슐 300mg</b> Erdosteine 300mg	급·만성호흡기질환의 점액용해 및 거담	1회 300 mg을 1일 2~3회	669906660 196원	30캡슐/병 500캡슐/병	<b>R05CB15</b> 일반 222 진해거담제
	<b>엘피진정</b> Levodropropizine 60mg	급·만성기관지염의 기침	성인 : 1회 60mg, 1일 3회(최소 6시간 간격)	669902980 135원	30정/병 300정/병	<b>R05DB27</b> 전문 222 진해거담제
	<b>뉴카민시럽</b> Pelargonium Sidoides 11% Ethanol Extract (1→8~10) · Glycerin Mixed Solution(8:2) 171.6mg/mL	급성 기관지염	·성인 및 12세 이상 : 1회 9mL, 1일 3회 ·6세 이상~12세 미만 : 1회 6mL, 1일 3회 ·1세 이상~6세 미만: 1회 3mL, 1일 3회 식전 30분에 경구 복용	669905561 24원	500mL/병	<b>R07AX</b> 전문 229 기타의 호흡기관용약
	<b>모메탈나잘 스프레이</b> Mometasone Furoate 0.5mg/mL	계절 알레르기비염 및 연중비염. 중등도~중증의 계절 알레르기 비염의 증상 예방요법, 비염중, 중증의 세균 감염이 없는 급성 비부비동염	알레르기 비염, 비염중 : 1회 각 비공에 2번씩 1일 1회 급성 비부비동염 : 1회 각 비공마다 2번씩 1일 2회	669905171 10,691원	18g (140dose) /병	<b>R01AD09</b> 전문 132 이비과용제
	<b>몬테스트정 10mg</b> Montelukast 10mg	1. 천식의 방지 및 지속적 치료 2. 계절 및 연중 알레르기비염 증상 완화	1. 15세 이상 : 1일 1회 1정 2. 천식 : 저녁에 복용 3. 알레르기비염: 환자 상태에 따라 4. 둘 다 있는 경우: 저녁에 복용	669906860 658원	28정 (7정/PTPx4)	<b>R03DC03</b> 전문 149 기타의 알레르기용약






# 식욕억제제 비급여

A 08

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>피티엠정</b> Phentermine HCl 18.75mg (As Phentermine 15mg)	초기 체질량지수(BMI)가 30kg/m <sup>2</sup> 이상, 또는 다른 위험인자가 있는 BMI 27kg/m <sup>2</sup> 이상인 외인성 비만 환자에서 운동, 행동 수정 및 칼로리 제한을 기본으로 하는 체중감량 보조요법	1일 1~2회, 1회 1정	669905860 440원	30정/병 100정/병	A08AA01 전문/항정 123 자율 신경제
	<b>페스틴정</b> Phentermine HCl 37.5mg (As Phentermine 30mg)		1일 1회, 1회 1정	669904160 770원	30정/병 100정/병	
	<b>펜틴정</b> Phendimetrazine tartrate 35mg		1일 2~3회, 1회 1~2정	669904170 330원	30정/병 300정/병	

# 지방흡수억제제 비급여

A 08

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>제로비캡슐</b> 60mg Orlistat 60mg	체질량 지수(BMI) 30 kg/m <sup>2</sup> 이상 또는 다른 위험인자 (예, 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증)가 있는 27kg /m <sup>2</sup> 이상의 비만환자에 있어 저칼로리 식이와 함께 체중감소 또는 체중유지를 포함한 비만치료 또는 체중 재증가의 위험감소	지방을 함유하는 식사와 함께 복용하거나 식사 후 1시간 이내 1일 3회, 1회 120mg	669907830 590원	30캡슐/병 300캡슐/병	A08AB01 전문 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품
	<b>제로비캡슐</b> 120mg Orlistat 120mg			669907840 950원		
	<b>제로비정</b> 120mg Orlistat 120mg			669908210 890원		



\* 각 제품의 효능·효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.

# 대사촉진제 비급여

A 08 16 R 05

대사촉진제

비급여




제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>디카틴정</b> L-carnitine 330mg	1차성, 2차성 카르니틴 결핍증 허혈성 심질환에 의한 심근대사장애 : 협심증, 급성심근경색	1일 2~3g을 2~3회 분할 경구투여	6699050180 220원	90 정/상자 (10정/ PTP×9)	<b>A16AA01</b> 일반 219 기타의 순환계용약
	<b>다이엔캡슐</b> Green tea powder 250mg Orthosiphon powder 150mg	비만 또는 과체중시 체중감량 보조제	1일 3회, 1회 1~2캡슐	669900460 141원	300캡슐/병	<b>A08AX</b> 일반 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품
	<b>카푸린에스정</b> Ephedrine HCl 25mg Caffeine anhydrous 25mg Acetaminophen 200mg	감기의 증상상 (인후(목구멍)통, 기침 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화	1일 3회, 1회 1정	669905870 140원	60정/병	<b>R05X</b> 일반 114 해열, 진통, 소염제

탄수화물흡수억제제

비급여

# 탄수화물흡수억제제 비급여


A 10 V 03

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>미그보스 필름코팅정</b> Miglitol 50mg	식이요법만으로는 충분히 조절되지 않거나 혹은 식이요법과 설폰닐우레아의 병용요법으로 치료가 되지 않은 인슐린 비의존성 당뇨병	초기 : 1정 1일 3회 복용 내약성에 따라 4-12주간의 치료 후 유지 용량으로 100밀리그램을 1일 3회까지 정상적으로 증량	749655123 330원	30정/병 500정/병	<b>A10BF02</b> 전문 396 당뇨병용제
	<b>루치온정 50mg</b> Glutathione(Reduced) 50mg	약물중독	1일 1~3회 (50mg 최대 6정, 100mg 최대 3정)	669907880 220원	300정/병	<b>V03AB32</b> 일반 392 해독제
	<b>루치온정 100mg</b> Glutathione(Reduced) 100mg			669907860 440원	100정/병	


Product List

2025

# 탄수화물흡수억제제 비급여

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드	포장단위	ATC코드
				약가		식약처분류
	<b>카보글루엑스캡슐</b> 건강당콩분말 / Vit.C / Vit.B / Vit.B2 / Vit.B6 / Whey Calcium	[비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민C] 결합조직 형성과 기능 유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요	1일 2회, 1회 2캡슐	330원	300캡슐/병	건강기능식품

## NEW

	<b>버닝슬림정</b> 가르시니아캄보지아, 스누넨더하바네로, 히드록시프로필메틸셀룰로스 외	탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음.	1일 2회, 1회 2정	363원	180정/병	건강기능식품
--	--	---	--------------	------	--------	--------

# 기타비만보조제 비급여

A 03 06

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드	포장단위	ATC코드
				약가		식약처분류
	<b>탐부틴정 200mg</b> Trimbutine maleate 200mg	식도역류 및 열공헤르니아, 위 십이지장염, 위 십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상(복통, 소화불량, 구역, 구토), 과민성대장증후군 및 경련성 결장, 소아 질환: 습관성 구토, 비강염성 장관통과장애 (변비, 설사), 동요자극, 수면장애	1일 3회, 1회 1/2~1정	669903930 120원	500정/병	<b>A03AA05</b> 일반 239 기타의 소화기관용약
	<b>마노엘정</b> Aloe Ext.100mg Magnesium hydroxide 500mg Ursodeoxycholic acid 10mg	변비, 변비에 따른 다음 증상의 완화: 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질	15세 이상: 1회 1~2정, 1일 2회 (식전, 식간)	669905390 121원	300정/병	<b>A06AB20</b> 일반 238 하제, 완장제
	<b>뉴코딜정</b> Bisacodyl 3mg Docusate sodium 16.75mg	변비에 따른 다음 증상의 완화: 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질	1. 15세 이상: 1회 1~2정, 1일 3회 식후에 복용 2. 11세 이상 ~15세 미만: 1회 2/3 ~ 3/4정, 1일 3회 식후에 복용 3. 7세 이상 ~ 11세 미만: 1회 1/2 ~ 1정, 1일 3회 식후에 복용	669907370 92원	500정/병	<b>A06AB52</b> 일반 238 하제, 완장제

\* 각 제품의 효능·효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.

# 기타비만보조제

비급여

A 08 C 10 N 03 06

기타비만보조제

비급여

Daehan Nupharm

Product List

2025

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>마메이드정</b> Alginate acid 200mg Carboxymethyl cellulose sodium 100mg	음식물 섭취 감소를 통한 체중감량의 보조요법	1일 3회, 1회 2정	669904770 242원	300정/병	<b>A08AX</b> 일반 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품
	<b>캠벨정</b> 방풍통성산건조엑스 (4.64 → 1) 237.5mg	음식물 섭취 감소를 통한 체중감량의 보조요법	1일 3회, 1회 4정 (식전 또는 식간 복용)	66990360 121원	500정/병	<b>A08AX</b> 일반 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품
	<b>캠벨더블정</b> 방풍통성산건조엑스 (4.64 → 1) 475mg	음식물 섭취 감소를 통한 체중감량의 보조요법	1일 3회, 1회 2정(식전 또는 식간 복용)	220원	300정/병	<b>A08AX</b> 일반 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품
	<b>나오미정</b> 방기황기탕건조엑스 (7.52 → 1) 244mg	살색이 희고, 피로하기 쉬우며, 땀이 잘 나는 경향이 있는 다음 증상 : 비만 (근육에 긴장감이 없고 몰살진), 관절통, 부종	1일 3회, 1회 4정(식전 또는 식간 복용)	669905310 110원	360정/병	<b>A08AX</b> 일반 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품
	<b>콜레스텐연질캡슐</b> Safflower oil 333.33mg (리놀산으로서 250mg) Tocopherol acetate 6.67mg Pyridoxine HCl 0.67mg	비만증, 당뇨병, 본태성 고콜레스테롤혈증에 의한 지질대사 개선	1일 3회, 1회 3캡슐 (식사 30분 전 복용)	669903770 130원	300캡슐/병	<b>C10B</b> 일반 218 동맥경화용제
	<b>토피정 25mg</b> Topiramate 25mg	간질, 편두통의 예방	간질 : 처음 1주일 동안 저녁에 1정씩 투여하고 1~2주 간격으로 1일 25또는 50mg 씩 증량하여 1일 2회 (단독요법으로서의 권장용량은 1일 100 ~ 200mg) 편두통의 예방 : 처음 1주일 동안은 저녁에 1정으로 투여를 시작하고 주간격으로 1정/ 일씩 증량	669905190 385원	30정/병 100정/병	<b>N03AX11</b> 전문 113 항간질제
	<b>토피트정</b> Topiramate 100mg	간질, 편두통의 예방	간질 : 처음 1주일 동안 저녁에 1정씩 투여하고 1~2주 간격으로 1일 25또는 50mg 씩 증량하여 1일 2회 (단독요법으로서의 권장용량은 1일 100 ~ 200mg) 편두통의 예방 : 처음 1주일 동안은 저녁에 1정으로 투여를 시작하고 주간격으로 1정/ 일씩 증량	669905500 880원	30정/병 100정/병	<b>N03AX11</b> 전문 113 항간질제
	<b>디프렌캡슐 10mg</b> Fluoxetine HCl 11.2mg (As Fluoxetine 10mg)	우울증, 신경성 식욕과항진증, 강박반응성 질환, 월경전 불쾌장애	1일 60mg, 1일 투여량은 80mg를 초과하지 않는다.	669906140 220원	30캡슐/병 300캡슐/병	<b>N06AB03</b> 전문 117 정신신경용제
	<b>디프렌캡슐</b> Fluoxetine HCl 22.4mg (As Fluoxetine 20mg)	우울증, 신경성 식욕과항진증, 강박반응성 질환, 월경전 불쾌장애	1일 60mg, 1일 투여량은 80mg를 초과하지 않는다.	669901000 424원 (급여, 비급여 동일)	30캡슐/병 300캡슐/병	<b>N06AB03</b> 전문 117 정신신경용제

# 기타비만보조제

비급여

N

07

R

06

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>나렉스정</b> Naltrexone HCl 25mg	적정관리 프로그램과 병행하여 알코올 의존성 치료 및 외인성 아편류의 효과차단	1일 1회, 1회 2정	669906120 1,350원	30정/병 100정/병	<b>N07BB04</b> 전문 392 해독제
	<b>히스탄에프정</b> 16mg Betahistine HCl 16mg	메니에르병에 의한 어지러움, 이명, 청력소실	초기용량 : 1일 3회, 1회 1정 유지용량 : 1일 24 ~48mg	669904760 165원	30정/병 300정/병	<b>N07CA01</b> 전문 116 진혼제
	<b>히스탄에프정</b> 24mg Betahistine HCl 24mg			669904780 198원		
	<b>파인에스정</b> Bromelain 45mg Caffeine anhydrous 20mg Diphenhydramine HCl 25mg	코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 증상의 완화	1일 3회, 1회 1정	669907540 198원	300정/병	<b>R06AA52</b> 일반 141 항히스타민제

기타비만보조제

비급여

# 비타민제



비급여

A

11

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
------	--------------	-------	-------	------------	------	----------------

NEW

	<b>엔피비타비정</b> benfotiamine 50mg, pyridoxine hydrochloride 50mg, folic acid 0.25mg, cyanocobalamin 0.2mg	1. 비타민 B1, B6의 보급 -육체피로 -임신·수유기 -병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 -이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다. 1) 비타민B1(벤포티아민) -다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등) -각기, 눈의 피로 2) 비타민B6(피리 독신염산염) -다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안 염), 설염(혀염), 습진, 피부염	만 12세 이상 및 성인: 1일 2회, 1회 1정 복용 또는 1일 1회, 1회 2정 복용	- 미정	60정/병	<b>A11JA</b> 일반 319 기타의 비타민제
	<b>엔피셀렌씨정</b> selenium in dried yeast 66.66mg, ascorbic acid 50mg, zinc oxide 31.11mg, chromium yeast 12.5mg, manganese sulfate hydrate 3.07mg	1. 다음 경우의 비타민 C의 보급 - 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후 (병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 2. 아연의 보급 3. 셀레늄의 보급	만 12세 이상 및 성인: 1일 2회, 1회 1정 복용 또는 1일 1회, 1회 2정 복용	- 미정	60정/병	<b>A11GB</b> 일반 314 비타민C 및 P제

비타민제

비급여



Product List

\* 각 제품의 효능·효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.

# 비타민제 비급여

A

11

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>바이타비정</b> Folic acid 250µg Cyanocobalamin 500µg Pyridoxind HCl 50mg	다음경우의 비타민B6의 보급 - 임신 수유기 - 병중 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 다음 증상의 완화 : 구각염 (입꼬리염, 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염)	만 8세 이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 1정	669906110 130원	300정/병	<b>A11JA</b> 일반 313 비타민 B제
	<b>에니플러스캡슐</b> Vit.C / Magnesium oxide / Crystalline cellulose / L-tyrosine	[비타민C] 결합조직 형성과 기능 유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [마그네슘] 에너지 이용에 필요, 신경과 근육기능 유지에 필요	1일 2회, 1회 1 캡슐	220원	300캡슐/병	건강기능식품


비타민제

비급여

# 피부 · 모발용제 비급여

D

11

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>엔피나정</b> Finasteride 1mg	성인남성 (만 18~41세)의 남성형 탈모증(안드로겐 탈모증)의 치료	1일 1회 1mg을 경구투여하며, 식사와 관계없이 투여	669907390 비급여	30정 (10정 /PTP×3)	<b>D11AX10</b> 전문 267 모발용제


피부 · 모발용제

비급여

# 신경계용제 비급여

N

06


제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>지타코정</b> 240mg Ginkgo leaf dry extract 240mg	집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증(동맥경화 증상)과 같은 증상이 동반되는 정신 기능 저하	식사 관계없이 1일 1회 1정	669908510 590원 (비급여)	300정/병	<b>N06DX02</b> 일반 219 기타의 순환계용약

NEW

신경계용제

비급여

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<p><b>멀티비타주</b></p> <p>1 Vial 중 Ascorbic acid 100mg, Biotin 60<math>\mu</math>g, Cyanocobalamin 5<math>\mu</math>g, Dextranthenol 15mg, Ergocalciferol 5<math>\mu</math>g (200IU), Folic acid 400<math>\mu</math>g, Nicotinamide 40mg, Pyridoxine HCl 4.86mg, Riboflavin sodium phosphate 3.6mg, Thiamine HCl 3.81mg, Tocopherol acetate 10mg, Vitamin A 3,300IU</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>수액제로 영양을 공급받는 환자의 비타민 유지요법</li> <li>다음 환자의 비타민(비타민 K제외) 결핍 예방                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외과수술시, 중증화상, 골절 및 기타 외상</li> <li>- 중증감염증, 혼수상태</li> </ul> </li> </ol>	<p>11세 이상의 소아 및 성인 : 이 약에 주사용 증류수 5 mL를 가볍게 흔들어 녹인 다음, 5분 이내에 정맥주사용 포도당 주사액, 생리식염 주사액 또는 이와 유사한 수액제 500 ~ 1,000 mL에 혼합하여 1일 1회 점적정맥주사 한다.</p>	<p>669906441</p> <p>비급여</p>	<p>10V</p>	<p><b>B05XC</b></p> <p>전문 319 기타의 비타민제</p>
	<p><b>대한뉴팜 비타민씨주 20mL</b></p> <p>1 Vial (20mL) 중 Ascorbic acid 10g</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>비타민 C 결핍증의 예방과 치료 : 괴혈병 등</li> <li>비타민 C의 요구량이 증가하는 경우 : 임부·수유부, 심한 육체노동 시 등</li> <li>다음 질환 중 비타민 C 결핍증 또는 대사장애에 관여되는 것으로 추정되는 경우                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 모세관출혈(비출혈, 치육출혈, 혈뇨 등)</li> <li>2) 약물투여(살리실산염, 아트로핀, 염화암모늄, 바르비탈산염 등)</li> <li>3) 골절시의 골기질형성, 골유합촉진</li> <li>4) 기미, 주근깨, 염증후의 색소침착</li> <li>5) 광선과민성피부염 등</li> </ol> </li> </ol>	<p>아스코르빈산으로서 1일 50~1,000 mg을 1일 1회~수회 분할하여 피하, 근육 또는 정맥주사 한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.</p>	<p>669900561</p> <p>비급여</p>	<p>10V</p>	<p><b>A11GA01</b></p> <p>전문 314 기타의 비타민C 및 P제</p>
	<p><b>푸르민주 5mg</b></p> <p>1 Amp (10mL) 중 Fursultiamine HCl 54.6mg (푸르설티아민으로서 50mg)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>비타민B1 결핍증의 예방 및 치료</li> <li>비타민B1의 수요가 증대하여 음식으로부터 섭취가 불충분한 때의 보급(소모성 질환, 감상생기능항진증, 임부, 수유부, 격렬한 육체 노동시 등)</li> <li>베르니케뇌병증(Wernicke encephalopathy)</li> <li>각기심장 장애</li> <li>다음 질환에 의한 비타민B1의 결핍 또는 대사 장애가 관여한다고 추정되는 경우                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신경통, 근육통, 관절통, 말초 신경염, 말초 신경 마비, 심근 대사 장애, 변비 등의 위장 운동 기능 장애, 수술 후 장관 마비</li> </ul> </li> </ol> <p>* 자세한 내용은 설명서를 참조하여 주십시오.</p>	<p>푸르설티아민으로서 보통 성인 1일 5 ~ 100 mg을 피하, 근육내 또는 정맥내 주사한다. 증상에 따라 적절히 증감한다.</p>	<p>669904211</p> <p>비급여</p>	<p>10A</p>	<p><b>A11DA01</b></p> <p>전문 312 비타민B1제</p>

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>펜타비타주</b> 1 Amp (2mL) 중 Dexpanthenol 500mg	1. 판토텐산결핍증의 예방 및 치료 2. 판토텐산의 수요가 증대하고 식사로부터 섭취가 불충분한 때의 보급(소모성질환, 갑상선기능항진증, 임부, 수유부 등) 3. 다음 질환 중 판토텐산의 결핍 또는 대사 장애가 관여한다고 추정되는 경우: 스트렙토마이신 및 카나마이신에 따른 부작용의 예방 및 치료, 접촉피부염, 급만성습진, 수술 후 장관 마비)	- 성인 : 덱스판테놀로서 1회 20~100mg 1일 1-2회 근육 또는 정맥주사한다. 수술후 장관 마비에는 1회 50~500mg 1일 1-3회 투여하고 필요시 6회까지 증가 할 수 있다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다. - 주사액의 조제 : 정맥주사시는 이 약 500mg 을 포도당주사액 또는 유산염링겔용액 등의 정맥주사용액과 혼합하여 천천히 정맥내 주입한다.	669904691 비급여	50A	<b>A11HA30</b> 전문 239 기타의 소화기관용약
	<b>헥사비타주</b> 1 Amp (2mL) 중 Pyridoxine HCl 100mg	1. 비타민 B6 결핍증의 예방 및 치료_ 약물투여(예: 이소니아지드, 하이드랄라진, 피라진아미드, 페니실라민)로 인한 경우 포함 2. 비타민 B6의 수요가 증대하여, 식사로부터의 섭취가 불충분할 경우_ 소모성 질환, 임부·수유부, 에스트로겐제제(예: 경구피임제) 복용자 등  * 자세한 내용은 설명서를 참조하여 주십시오.	경구복용이 어려울 경우 - 성인 : 염산피리독신으로서 1일 10~100 mg을 1~2회 분할하여 근육, 피하 또는 정맥주사 한다. - 비타민 B6 의존증인 경우에는 고용량을 투여할 수 있다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.	669904681 비급여	50A	<b>A11HA02</b> 전문 313 비타민B제 (비타민B1을 제외)
	<b>비코라민주</b> 1 Amp (2mL) 중 Hydroxocobalamin 5mg	비타민 B12 결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈과 관련된 다발성신경염의 치료	-성인 : 히드록스코발라민으로서 1일 1회 5,000ug을 근육주사 또는 정맥주사한다. 임상적 반응에 따라 저용량으로 치료를 지속한다.	669906481 비급여	50A	<b>B03BA03</b> 전문 114 해열, 진통, 소염제
	<b>바이타디주</b> 1 Amp (1mL) 중 Cholecalciferol 5mg (200,000IU.)	1. 비타민 D가 결핍된 고령자 및 청소년에서의 비타민D 결핍의 예방과 치료 2. 비타민 D가 결핍된 성인에서의 비타민D 결핍의 치료	- 성인 : 콜레칼시페롤로서 200,000IU을 근육주사한다. - 청소년 : 콜레칼시페롤로서 200,000IU을 근육주사한다. - 고령자 : 콜레칼시페롤로서 100,000IU을 근육주사한다. 연간 투여량이 콜레칼시페롤로서 600,000IU가 넘지 않도록 한다.	669906221 비급여	10A	<b>A11CC05</b> 전문 311 비타민A 및 D제



제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<p><b>대한뉴팜 염화마그네슘주 10%</b></p> <p>1 Amp (10mL) 중 Magnesium chloride 1g</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 토르사드 드 포인트(Tor-sade de pointe)치료</li> <li>2. 저마그네슘혈증을 동반한 급성 저 칼륨혈증 치료</li> <li>3. 전해질 불균형시 마그네슘 보충</li> <li>4. 비 경구영양 공급시 마그네슘 보충</li> <li>5. 자간전증(임신중독증) 위험의 예방 및 치료</li> </ol>	<p>- 토르사드 드 포인트(Tor-sade de pointe) 치료</p> <p>- 저마그네슘혈증을 동반한 급성 저칼륨혈증 치료</p> <p>- 전해질 불균형시 마그네슘 보충 및 비 경구영양 공급시 마그네슘 보충</p> <p>- 자간전증(임신중독증) 위험의 예방 및 치료</p> <p>* 자세한 내용은 설명서를 참조하여 주십시오.</p>	<p>669905891</p> <p>비급여</p>	<p>10A</p>	<p><b>B05XA11</b></p> <p>전문 322 무기질제제</p>
	<p><b>징크에스주 5mL</b></p> <p>1 Vial (5mL) 중 Zinc sulfate hydrate 22mg (아연으로서 5mg)</p>	<p>비경구영양요법(TPN)시 아연 보충</p>	<p>의사의 처방에 따라 사용하되, 혈장 미량 원소량을 확인하여 용량 조절의 지침으로 삼는다.</p> <p>* 자세한 내용은 설명서를 참조하여 주십시오.</p>	<p>669905811</p> <p>비급여</p>	<p>10V</p>	<p><b>B05XA18</b></p> <p>전문 322 무기질제제</p>
	<p><b>징크에스주 10mL</b></p> <p>1 Vial (10mL) 중 Zinc sulfate hydrate 44mg (아연으로서 10mg)</p>	<p>비경구영양요법(TPN)시 아연 보충</p>	<p>의사의 처방에 따라 사용하되, 혈장 미량 원소량을 확인하여 용량 조절의 지침으로 삼는다.</p> <p>* 자세한 내용은 설명서를 참조하여 주십시오.</p>	<p>669905541</p> <p>비급여</p>	<p>10V</p>	<p><b>B05XA18</b></p> <p>전문 322 무기질제제</p>
	<p><b>셀레네주 10mL</b></p> <p>1 Vial (10mL) 중 Sodium selenite pentahydrate 1.66mg (셀레늄으로서 500µg)</p>	<p>영양공급으로 보충될 수 없는 셀레늄 결핍 환자에서 셀레늄 보급</p>	<p>셀레늄으로서 1일 100 µg을 근육주사 또는 정맥주사한다. 필요한 경우 1일 200 µg까지 증량할 수 있다.</p> <p>치료가 적절한지를 확인하기위하여 셀레늄의 혈중농도를 측정해야한다. 만약 이 약을 종합 비경구 영양요법(TPN)기본 주사에 추가로 투여할 경우 반드시 1 일 용량은 셀레늄으로서 100 µg을 사용해야 한다.</p>	<p>669907071</p> <p>비급여</p>	<p>10V</p>	<p><b>B05XA20</b></p> <p>전문 322 무기질제제</p>
	<p><b>멀티트레이스주</b></p> <p>1 Vial (10mL) 중 Zinc sulfate hydrate 43.9mg(아연으로서 10mg), Cupric sulfate 15.7mg(구리로서 4mg), Manganese sulfate 3.08mg(망간으로서 1mg), Chromic chloride 205µg (크롬으로서 40µg), Selenious acid 327µg (셀레늄으로서 200µg)</p>	<p>경정맥 영양보급시 미량원소(아연, 구리, 망간, 셀레늄, 크롬)의 보급</p>	<p>의사의 처방에 따라 사용하되, 혈장 미량 원소량을 확인하여 용량 조절의 지침으로 삼는다.</p> <p>* 자세한 내용은 설명서를 참조하여 주십시오.</p>	<p>669906881</p> <p>비급여</p>	<p>10V</p>	<p><b>B05XA31</b></p> <p>전문 339 기타의 혈액 및 체액용약</p>

\* 각 제품의 효능·효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.

# 항산화제 주사제

A 16 V 03

항산화제

주사제

순환기계용제

주사제


Product List

2025

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>신델라주</b> 1 Amp (5mL) 중 Thioctic acid 25mg	티옥트산의 수요가 증대되는 경우의 보급(격심한 육체노동시), Leigh 증후군(아급성괴사성뇌척수염), 중독성(스트렙토마이신, 가나마이신에 의한) 및 소음성(직업성)의 내이성 난청	티옥트산으로서 통상 성인 1일 1회 10~25mg을 정맥내 주사한다. 단, 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.	669905781 비급여	10A	<b>A16AX01</b> 전문 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품
	<b>루치온주 600mg</b> 1 Vial 중 Glutathione(reduced) 600mg	시스플라틴 또는 유사계열 화학요법에 의한 신경성질환의 예방	중증의 경우 1일 600-1,200mg을 근육 주사 또는 점적 정맥 주사한다. 수일에 걸쳐 치료하는 경우 또는 경미한 경우에는 1일 300-600mg을 근육 주사 또는 점적 정맥 주사한다.	669905751 비급여	10V	<b>V03AB32</b> 전문 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품
	<b>루치온주 1200mg</b> 1 Vial 중 Glutathione(reduced) 1200mg			669906031 비급여		
	<b>바이온주</b> 1 Vial 중 Glutathione(reduced) 600mg			662502981 비급여		

# 순환기계용제 주사제

A 16


제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>메조카틴주</b> 1 Amp (10mL) 중 L-carnitine 2g	1. 1차성, 2차성 카르니틴결핍증 2. 허혈성심질환에 의한 심근대사장애 : 협심증, 급성심근경색 3. 혈액투석중인 말기 신 질환자의 카르니틴 결핍증 치료	1. 1차성, 2차성 카르니틴결핍증 허혈성 심질환에 의한 심근대사장애 : 협심증, 급성심근경색 성인 : 엘-카르니틴으로서 1일 2~3그램을 2~3회 분할하여 근육 또는 정맥주사한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다. 2. 혈액투석중인 말기 신 질환자의 카르니틴 결핍증 치료 초기에는 10~20 밀리그램/킬로그램을 매회 혈액투석 종료시 2~3분에 걸쳐 정맥주사한다. 단, 혈액투석전 혈장 엘-카르니틴치에 따라 용량을 조절할 수 있다.	669905781 비급여	10A	<b>A16AA01</b> 전문 219 기타의 순환계용약

# 순환기계용제

주사제

N

06

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>지타코주</b> 1 Amp (5mL) 중 Ginkgo leaf extract 17.5mg	1. 뇌혈액순환장애 및 뇌영양장애(뇌혈관부전), 다음 증상을 수반하는 뇌기능장애 : 지적 및 경각능력저하, 어지러움, 이명, 두통, 시력장애, 기억력감퇴, 불안, 우울감, 내이성난청, 혈관성·대사성 경부증상으로 인한 청각 및 언어능력 저하 2. 동맥경화성 혈관증, 괴저 상태의 당뇨병성 혈관손상, PAOD-(말초동맥폐색질환 또는 간헐성파행증) 폐색성 혈관내막염, 레이노드병과 기타 호르몬성 및 신경성 혈관장애, 혈관증, 혈관증으로 인한 영양장애등과 같은 말초동맥순환장애	- 1일 5 ~ 10mL를 근육주사 또는 정맥주사하거나 2일마다 15mL를 정맥 주사한다. - 급성치료시 : 1일 25 밀리리터를 정맥주사 또는 점적정주한다. - 중증치료시 : 1일 25-50 밀리리터를 정맥주사 또는 점적정주한다.	669903401 비급여	25A	<b>N06DX02</b> 전문 219 기타의 순환계용약

순환기계용제


주사제

# 진경제

주사제

A

12

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>미네엠주</b> 1 Amp (5mL) 중 Magnesium sulfate 0.5g	저마그네슘혈증에 의한 경련, 자간증의 발작, 자궁경직 방지, 전해질보급 (저마그네슘혈증)	-저마그네슘혈증에 의한 경련 : 마그네슘황산염으로서 1~2g을 정맥주사한다. (4.05 ~ 8.1 mmol). -자간증의 발작 : 이 약으로서 초기 4g을 정맥주사한다.(16.2 mmol). 이후 1g을 투여할수 있다. -전해질보급(저마그네슘혈증) : 이 약으로서 1g을 6시간마다 4회 근육주사한다. 또는이 약 5g을 5% 포도당 주사액이나 0.9% 생리식염 주사액에첨가하여 3 시간동안 정맥내투여를 할수있다. 결핍증 치료시 환자의 신장배출기능을 잘 살펴야 한다. -소아 : 이 약의 안전성은 시험된 바 없다.	669904701 비급여	25A	<b>A12CC02</b> 전문 124 진경제

진경제


주사제

# 단백아미노산제제

주사제

G

02

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>프라세인엠주</b> 1 Amp (2mL) 중 자하거추출물 2mL	갱년기 장애 증상의 개선	자하거추출물로서 1회 2 mL, 1주일에 3회씩 2주간(총 6회) 피하주사 한다.	669904260 비급여	10A	<b>G02CX</b> 전문 325 단백아미노산 제제

단백아미노산제제

주사제

\* 각 제품의 효능·효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.




제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>티모신주</b> 1 Vial 중 Thymosin alpha1 1.6mg	면역기능이 저하된 고령 환자의 인플루엔자 백신접종시의 보조요법	이 약 900ug/m <sup>2</sup> (1바이알)을 백신접종 첫 주부터 4주간 주 2회씩 피하 또는 근육 주사 한다. 투여 직전, 첨부된 용제에 녹여 주사한다.	669907271 비급여	2V (첨부용제 2A)	<b>L03AX</b> 전문/희귀 429 기타의 종양 치료제
	<b>이스카도M 0.01mg</b> 1 Amp (1mL) 중 Viscum Album (Mali) Soluble Extract(1→5) 0.05mg/mL	종양의 치료, 종양수술후 재발의 예방, 전암증 병소 조혈기관의 약성질환, 골수기능의 자극	다음과 같은 용량에 따라 피하 주사한다. 1. 초기 단계 별도로 처방된 경우를 제외하고는, 치료 시작 시 이약의 과민반응을 피하기 위하여 시리즈 0에서부터 단계적인 용량증가가 추천된다. 이전의 다른 비스콤알BUM 제제의 치료가 있었다라도 이 약의 시리즈 0에서부터 다시 치료를 시작한다. 이 약 1ml를 제품 시리즈 구성에 따라서 주 2~3회 피하주사한다. 시리즈 0단계가 순응되면 개개 환자가 반응 용량에 도달할 때까지 시리즈 또는 II 단계로 진행이 가능하다. 최적 용량 또는 투여량은 개별적으로 결정되어야 한다. 현재 단일제 또는 병용투여 시 발생할 수 있는 반응에 기초하여 결정한다. 2. 유지 단계 별도로 처방된 경우를 제외하고는 개별적으로 결정된 최적 용법용량으로 치료를 지속한다. 유지기간 동안 시리즈의 치료는 가장 높은 강도를 나타내는 용량, 또는 해당 종류의 묽음을 사용하는 것으로 지속한다.(1가지 용량의 앰플 묽음). 습관화 영향을 피하기 위한 규칙적인 투약이 요구된다. 3. 투약 간격 별도로 처방된 경우를 제외하고는 1주 2~3회 피하주사한다. 4. 신장애 환자 신기능 장애 환자의 경우 용량 결정을 위한 데이터가 불충분하다. 현재까지 일반적으로 용량조절의 필요성이 밝혀져 있지 않다.	053100041 비급여	7A	<b>L01CX</b> 전문/희귀 421 항악성 종양제
	<b>이스카도M 0.1mg</b> 1 Amp (1mL) 중 Viscum Album (Mali) Soluble Extract(1→5) 0.5mg/mL			053100101 비급여		<b>L01CX</b> 전문/희귀 421 항악성 종양제
	<b>이스카도M 1mg</b> 1 Amp (1mL) 중 Viscum Album (Mali) Soluble Extract(1→5) 5mg/mL			053100051 비급여		<b>L01CX</b> 전문/희귀 421 항악성 종양제
	<b>이스카도M 10mg</b> 1 Amp (1mL) 중 Viscum Album (Mali) Soluble Extract(1→5) 50mg/mL			053100011 비급여		<b>L01CX</b> 전문/희귀 421 항악성 종양제
	<b>이스카도M 20mg</b> 1 Amp (1mL) 중 Viscum Album (Mali) Soluble Extract(1→5) 100mg/mL			053100091 비급여		<b>L01CX</b> 전문/희귀 421 항악성 종양제
	<b>이스카도 Qu 0.01mg</b> 1 Amp (1mL) 중 Viscum album (Quercus) Soluble Extract(1→5) 0.05mg/mL			053100061 비급여		<b>L01CX</b> 전문/희귀 421 항악성 종양제
	<b>이스카도 Qu 0.1mg</b> 1 Amp (1mL) 중 Viscum Album (Quercus) Soluble Extract(1→5) 0.5mg/mL			053100081 비급여		<b>L01CX</b> 전문/희귀 421 항악성 종양제

# 항악성 종양제

주사제

L

01

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드	포장단위	ATC코드
				약가		식약처분류
	<b>이스카도 Qu 1mg</b> 1 Amp (1mL) 중 Viscum Album(Quercus) Soluble Extract(1→5) 0.5mg/mL	종양의 치료, 종양수술후 재발의 예방, 전암증 병소 조혈기관의 악성질환, 골수기능의 자극	5. 투여 방법 1) 가능하면 종양 및 전이부위에 근접하여 피하주사한다. 또는 신체 주사부위를 변경한다(예, 복부피부, 상완, 허벅지). 염증이 생긴 피부나 방사능조사 부위에 주사하지 않는다. 주사는 반드시 정확하게 피하로 한다. 2) 이 약은 동일 주사기내에 다른 성분의 약물과 함께 투여하지 않도록 한다. 3) 사용 후 개봉한 앰플을 보관하지 않는다(잔류물은 버린다). 6. 투여 기간 주치의가 투여기간을 결정한다. 투여기간은 원칙적으로 제한되지 않는다. 의사는 환자 개인의 상태와 재발의 위험성에 기초하여 결정한다. 투약은 수년간 지속해야 하며, 일반적으로 간격을 두고 중단한다.	053100071	7A	L01CX 전문/희귀 421 항악성 종양제
	<b>이스카도 Qu 10mg</b> 1 Amp (1mL) 중 Viscum Album(Quercus) Soluble Extract(1→5) 0.5mg/mL			053100021		L01CX 전문/희귀 421 항악성 종양제
	<b>이스카도 Qu 20mg</b> 1 Amp (1mL) 중 Viscum Album(Quercus) Soluble Extract(1→5) 0.5mg/mL			053100031		L01CX 전문/희귀 421 항악성 종양제

# 통증치료제




주사제

B

06

D

03

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드	포장단위	ATC코드
				약가		식약처분류
	<b>리포라제주</b> 1 Vial 중 Hyaluronidase 1,500 I.U.	1. 피하주사나 근육주사, 국소마취제 및 피하주입 시 침투력 증가 2. 조직 내에 과다하게 존재하는 체액 및 혈액의 재흡수 촉진	이 약 1,500I.U.를 주사용수나 생리식염수 등에 혼합하여 사용한다. 1. 피하주입 시(대량피하주사) 2. 피하주사나 근육주사 3. 국소마취제 4. 혈관외유출 5. 혈종  * 자세한 내용은 설명서를 참조하여 주십시오.	669904601	10V	B06AA03 전문 395 효소제제
	<b>뉴디엔주</b> 1 Vial (3mL) 중 Polydeoxyribonucleo- tide sodium 5.625mg	피부이식으로 인한 상처의 치료 및 조직 수복	1일 1바이알을 근육 또는 피하주사로 투여한다.	669906641	10V	D03AX 전문 490 기타의 조직세포의 기능용 의약품
	<b>뉴피엔</b> Sodium polynucleotide 20 mg/mL, Lidocaine HCL Monohydrate 3.2 mg/mL	관절강에 주입하여 물리적 수복을 통해 관절 부위의 기계적 마찰을 줄여주는 목적	6개월 내 최대 5회까지 투여(1 주 1회씩), 환자부담률 90%  * 자세한 내용은 설명서를 참조하여 주십시오.	의료기기 분류번호[등급] B04230.01[4]	2mL X 5syr / Box	의료기기 /조직수복용 생체재료

\* 각 제품의 효능·효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.

# 통증치료제

주사제

N

02

통증치료제



주사제

근골격계용제

주사제

Product List

2025

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>콜라플레오 3F101S</b> 1 Syr (1mL) 중 Attelo collagen 3%	내·외과적) 처치 및 수술 시 결손 또는 손상된 인대, 건, 근육, 생체막 등을 보충하기 위해 사용하는 콜라겐 함유 물질	* 자세한 내용은 설명서를 참조하여 주십시오.	비급여코드 의료기기 분류번호[등급] BM2600VT B04280.01(4)	프리필드 시린지 1관, 22G x 2ea	의료기기/ 콜라겐 사용조직 보충제
	<b>뉴포пам주</b> 1 Amp (2mL) 중 Nefopam HCl 20mg	급성통증의 대증요법, 특히 수술 후 통증	네포пам염산염으로서 1회 20 mg 을 근육 또는 정맥주사한다. 필요한 경우 1일 120 mg을 초과하지 않는 범위에서 6 시간마다 반복투여한다. 정맥주사는 15분 이상에 걸쳐 천천히 투여하고, 투여 후에는 환자를 15-20분간 그대로 누워서 휴식시키는 것이 바람직하다. 전해질이나 포도당 같은 수액제에 넣어 투여할 경우 투여시간에 비례하여 4시간 동안 30 mg을 투여하거나 6-8시간 동안 40 mg 을 투여한다. 이 약과 다른 약물을 혼합하여 주사하는 것은 피하도록 권장한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.	669906231 비급여	프리필드 시린지 1관, 22G x 2ea	<b>N02BG06</b>  전문 114 해열, 진통, 소염제



# 근골격계용제

주사제

M

05

09


제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>엔피본주</b> Ibandronate sodium monohydrate 3.375mg /3mℓ (3mg as ibandronic acid)	폐경 후 여성의 골다공증 치료	3개월에 한번씩 3mg, 15-30초간 정주. 보조적으로 칼슘과 비타민 D 섭취	669906741 53,864원	프리필드 시린지 1관	<b>M05BA06</b>  전문 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품
	<b>히아름플러스주</b> Sodium hyaluronate 10 mg/mℓ	슬관절의 골관절염, 견관절주위염 치료	성인: 1주 1회 1관, 3주간 투여, 슬관절장 또는 견관절 내 투여	669907351 15,299원	프리필드 시린지 3관	<b>M09AX01</b>  전문 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품

# 근골격계용제

주사제

M

05

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>펜믹스 졸레드론산주</b> zoledronic acid	1. 골다공증의 치료 (1) 폐경 후 여성의 대퇴골, 척추 및 비척추 골다공증성 골절의 발생을 감소 (2) 저충격 고관절 골절 후 새로운 골절 발생을 감소 (3) 남성의 골다공증 치료 2. 폐경 후 여성의 골다공증 예방 3. 글루코코르티코이드에 의한 골다공증의 치료 및 예방 4. 골파제트병의 치료	vented infusion line을 통해 일정한 속도로 점적 정맥 주사. (1) 골다공증의 치료/글루코코르티코이드에 의한 골다공증의 치료 및 예방: 1년 1회 (2) 폐경 후 여성의 골다공증 예방: 2년 1회 (3) 골파제트병의 치료: 15분 이상 단회 점적 정맥주사	677100811 164,163원	1병/상자 (100mL/병)	<b>M05BA08</b> 전문 399 따로 분류되지 않는 대사성의약품



# 백신 · 항독소

주사제

J

06

07

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>바리-엘백신</b> 1 Vial 중 약독수두생바이러스 2000PFU 이상(Oka균주)	수두의 예방	첨부된 용해액으로 용해하여 보통 0.5mL를 1회 피하주사한다.	051900011 비급여 (백신비 : 15,760원)	10V 첨부용제10V	<b>J07BK01</b> 전문 631 백신류
	<b>보란건조살무사 항독소주</b> 1 Vial 중 건조살무사항독소 6000I.U.	살무사 교상의 치료	1. 10배 희석액(이 약을 첨부용제로 용해한 후 다시 생리식염수로 약10배 희석)으로 말혈청 과민증시험 시행 2. 이 약은 첨부용제 <0.6% 염화나트륨주사액> 20mL로 완전히 용해하여 사용한다. 통상 가능한 조기에 약 6,000단위 <20mL>를 교상국소부위를 피하여 근육내<피하> 또는 정맥내에 주사하거나 혹은 생리식염수 등으로 희석하여 점적정맥주사한다. 증상이 경감되지 않을때는 2~3 시간 후에 3,000~6,000단위 <10~20mL>를 추가 주사한다.  * 자세한 내용은 설명서를 참조하여 주십시오.	073800011 249,500원	5V (첨부용제 5V)	<b>J06AA03</b> 전문 633 항독소 및 렙토스피라 혈청류

근골격계용제

주사제


백신 · 항독소

주사제

Product List



제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>리코리스주</b> 10mL 1 Amp (10mL) 중 Ammonium Glycyrrhiz- inate 26.5mg (글리시리진산으로서 20mg), Glycine 200mg, Cysteine Hydrochloride Monohydrate 10mg	두드러기, 습진, 알레르기성 피부질환, 약물중독의 보조요법, 만성간질환의 간기능 개선	성인 : 1회 2~20mL, 1일 1회 정맥주사한다. 만성간질환에는 1회 40~60mL, 1일 1회 정맥 또는 점적정맥주사한다. 증량하는 경우에는 1일 최대 100mL를 초과하지 않는다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.	669906281 비급여	25A	<b>A05BA</b> 전문 392 해독제
	<b>리코리스주</b> 20mL 1 Amp (20mL) 중 Ammonium Glycyrrhizinate 53mg (글리시리진산으로서 40mg), Glycine 400mg, Cysteine Hydrochloride Monohydrate 20mg			669904731 비급여		
	<b>이엔지주</b> 1 Amp (2mL) 중 Adenosine triphosphate disodium trihydrate 21.96mg (아데노신트리포스페이트 이나트륨삼수화물 로서 20mg)	다음 질환에 수반하는 여러 증상의 개선 : 근무력증, 심부전, 만성간염에 있어서의 간기능의 개선, 두부외상 후유증, 조절성 안정피로	삼인산아데노신이나트륨으로 서 보통 성인 1회 5~20mg을 1일 1~2회 피하, 근육 또는 정맥주사 한다. 정맥주사인 경우 포도당주사액 10~20mL 에 혼합한 후 3~5분간에 걸쳐 천천히 주사한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다	669906041 비급여	10A	<b>A16AX</b> 전문 399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품
	<b>사메주</b> 1 Vial 중 S-adenosyl-L-methi- onine sulfate 192mg (S-아데노실-L-메티오닌 으로서 100mg)	우울증	S-아데노실-L-메티오닌으로 서 1회 100~200mg, 1일 2회 15~20일간 정맥 또는 근육주사 한다. 이 약은 사용할 때 첨부된 용제에 용해하여 사용한다.	669907191 비급여	5V (첨부용제 5A)	<b>N06AX</b> 전문 392 해독제
	<b>뉴제닐주</b> 2mL 1 Amp (2mL) 중 Flumazenil 0.2mg	벤조디아제핀계 약물의 중추진정작용 역전(reversal)  * 자세한 내용은 설명서를 참조하여 주십시오.	이 약은 마취과 전문의 또는 경험이 많은 의사가 정맥주사한다. 이 약은 5% 포도당주사액, 유당첨가링겔액 또는 생리식염주사액에 희석하여 점적정맥주입할 수 있으며 다른 인공소생처치와 동시에 사용될 수도 있다. - 마취시 초회 권장 투여량으로 플루마제닐로서 0.2mg을 15초 이내에 정맥주사한다. - 중환자 치료시 초회 권장투여량은 플루마제닐로서 0.3mg이다.  * 자세한 내용은 설명서를 참조하여 주십시오.	669906581 7,625원	10A	<b>V03AB25</b> 전문 392 해독제
	<b>뉴제닐주</b> 5mL 1 Amp (5mL) 중 Flumazenil 0.5mg			669906301 11,756원	5A	



제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>디뉴텍스주</b> 1 Vial(2mL) 중 Sugammadex sodium 217.6mg (슈가마덱스로서 200mg)	로쿠로눔 또는 베쿠로눔에 의해 유도된 신경근 차단역전	이 약은 마취 전문의가 투여하거나 마취 전문의의 감독 하에서만 투여해야 한다. 이 약의 권장 용량은 사용된 마취요법과는 상관없이 로쿠로눔 또는 베쿠로눔으로 유도된 신경근 차단 정도에 따라 달라진다. 신경근 차단의 회복을 평가하기 위해서는 적절한 신경근 모니터링 방법을 사용할 것을 권장한다. 또한 신경근 차단의 재발생을 포함한 이상반응 발현에 대해 면밀히 관찰해야 한다. 이 약은 정맥주사(bolus injection)로 단회 투여한다. 일회 투여량을 기존 정맥주사 라인을 통해 신속히(10초 미만) 주입한다.  * 자세한 내용은 설명서를 참조하여 주십시오.	669908151 비급여	10V	<b>V03AB35</b> 전문 123 자율신경제

# 신제품

주사제

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	<b>더마신델라</b> Polynucleotide sodium 20mg/mL	성인 눈꼬리 잔주름을 일시적으로 개선하기 위해 사용	자세한 내용은 설명서를 참조하여 주십시오.	의료기기 분류번호[등급] B04230.01[4]	1mL X 2syr/box	의료기기 /조직수복용 생체재료
	<b>엔피플루 프리믹스주</b> Peramivir hydrate 349.4mg(페라미비르로서 300mg)	성인 및 2세 이상 소아의 A형 또는 B형 인플루엔자 바이러스 감염증의 치료 (인플루엔자 감염의 초기증상 발현 48시간 이내에 투여를 시작해야 한다.)	이 약은 프리믹스제제로서 1회 1bag(300mg/60mL)으로 성인, 2세 이상 소아 및 신기능장애 환자 중 해당 투여용량을 대체할 수 있는 경우에만 사용하며, 소분 및 희석하여 사용하지 않는다.	669908350 비급여	60mL/bag	<b>J05AH03</b> 전문 629 기타의 화학 요법제
<b>2월출시</b>	<b>중외주사용수</b> 400,800mL Water for injection 400mL, 800mL	각종 주사제의 용제	용해제로 적량을 사용한다.	바급여	400mL/bag, 800mL/bag	<b>V07AB</b> 전문 629 기타의 화학 요법제
<b>4월출시</b>	<b>대한뉴팜아르기닌 프리믹스주</b> L-arginine hydrochloride 10g /100mL	다음의 질환으로 인한 고암모니아혈증의 급성악화시, 경구투여로 조절이 불가능한 경우에 혈중 암모니아농도의 저하 1) 선천성 요소회로 이상 - Carbamyl phosphate synthetase(CPS)결핍 - Ornithine transcarbamylase (OTC)결핍 - Argininosuccinate synthetase(ASS)결핍 - Argininosuccinate lyase(ASL)결핍 2) 리신 뇨단백 불내증(Lysinuric protein intolerance)	환자의 체중 kg 당 엘아르기닌염산염으로서 0.2 ~ 1g을 1시간 이상 서서히 점적 정맥주사한다.	바급여	100mL/bag	<b>B05XB01</b> 전문399 따로 분류되지 않는 대사성 의약품

\* 각 제품의 효능·효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.

# 의료기기

의료기기 및 기타

의료기기

기타

마취제

기타

Product List

2025


제품사진	제품명	모델명	규격	니들	함량
	큐젤 Ultra	Ultra	2.0mL/1s	23G X 2ea	Hyaluronic acid 20mg/mL
	큐젤 Strong	Strong	3.0mL/1s	23G X 2ea	Hyaluronic acid 20mg/mL
	플로레리도카인 S	S	0.7ml/1s	30G X 2ea	Hyaluronic acid 20mg/mL
	플로레리도카인 N	N	1.0ml/1s	27G X 2ea	Hyaluronic acid 20mg/mL

# 마취제

의료기기 및 기타

N

01

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	제품코드 약가	포장단위	ATC코드 식약처분류
	리도칸크림 Lidocaine 96mg/g	남성성기 축각의 예민성 감소	성교 5~15분전에 연고로서 0.25~0.66그램(리도카인으로서 23~62밀리그램)을 도포한다. 용량과 적용시간은 개인에 따라 다르며 최저유효량을 사용한다. 24시간 이내에 최대 2그램(리도카인으로서 184밀리그램)을 초과하여 투여하지 않는다.	669904793 비급여	500g/통	N01BB02 일반 121 국소마취제

# 건강기능식품

의료기기 및 기타

제품사진	제품명 성분·함량	효능·효과	용법·용량	포장단위	비고
	<b>아스코르빈산 3g</b> Ascorbic acid 3g	아스코르빈산의 공급	물 또는 음료와 함께 섭취	100포	기타가공품
	<b>엠에스엠</b> MSM(디메틸설피론) 2g	관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음	1일 1회, 1회 1포를 물과 함께 섭취	60포	건강기능식품
	<b>Dr.DiNU 엠에스엠 정</b> MSM(디메틸설피론) 2g	관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음	1일 2회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취	120정	건강기능식품
	<b>Dr.DiNU 슈퍼아르기닌플러스포</b> L-Arginin 5000mg, L-carnitine, 판토텐산, 스누원더, 비타민B 4종, 아미노산 9종	L-아르기닌 등의 공급	1일 1회, 1일 1포를 물에 섞어 섭취	30포	기타가공품
	<b>Dr.DiNU 글루타민포</b> L-Glutamine 6000mg, L-Arginine 1000mg, 아연, 비타민A, 락토페린농축물, 유단백가수분해물	L-글루타민 등의 공급	1일 1회, 1일 1포를 물에 섞어 섭취	30포	기타가공품
	<b>Dr.DiNU 이문알파캡슐</b> 아연 2.55mg, 면역항산화분말, MSM, 연어이리단백추출물분말	정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요	1일 1회, 1일 1캡슐을 물에 섞어 섭취	60C/PTP	건강기능식품
	<b>모노메가3</b> EPA 560mg, DHA 250mg, DPA 68mg, Vit.E 2.4mg	혈중 중성지질 개선·혈행개선에 도움을 줄 수 있음. 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음.	1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취	60C/PTP	건강기능식품
	<b>얼티메이트 큐텐</b> 코엔자임Q10 100mg, PQQ, BioPerine, Organic Olive Oil	항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음.	1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취	30캡슐	건강기능식품
	<b>호모시스트롤 비-콤플렉스</b> 비타민 B군 공급	비타민 B군 공급	1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취	60캡슐	건강기능식품
	<b>울트라 코랄 칼마징크 D</b> 칼슘(Coral) 300mg, 마그네슘 150mg, 아연 18mg, 비타민D 15mcg-RE, Wolf Berry Extract 10mg, Shark Cartilage 10mg	칼슘, 마그네슘, 아연, 비타민D 공급	1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취	90정	건강기능식품
	<b>뉴트럴 화이트-씨</b> 비타민C(calcium) 1,000mg, Naringin Extract, Hesperidin, Rutin, Rosa Canina Fruit Extract	항산화 작용을 하여 유해 산소로부터 세포를 보호하는데 필요. 결합조직 형성과 기능유지에 필요. 철의 흡수에 필요	1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취	90정	건강기능식품

건강기능식품

기타

Product List

\* 각 제품의 효능·효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 및 기타 상세한 내용은 의약품 안전나라에서 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 확인하시기 바랍니다.



대한뉴팜 카카오채널

발행일 2025.02.01